

رساله در مورد سرخکان

سرخک

سرخکان میسازد.

سرخک یک خیلی ساری است و به سانی میشود.

سرخک :

• تب شدید

• سرفه کردن

• ریزش بینی

• چشم های

• که به طرف سایر می کند

سرخک های سینه، و آسیب دماغی نیز شده میتواند.

سرخک زیر سن 1 های حامله و افرادی که دارای معافیت ضعیفی داشته باشند سیر بدتر .

سرخک در ایرلند

در ماه های اخیر سرخک در جامعه ایرلند افزایش یافته است.

سرخک می بسیار جدی باشد و باعث کوری (نابینایی) و حتی مرگ هم می تواند.

که ب ای شان MMR (واکس سرخک - کلچرک - سرخکا نچه) ی نه شده به سرخکان مبتلا میشوند.

برای از سرخکان برای خویش چه می توانم انجام دهم؟

هر پدر و مادر می خواه سرخک نگه دارند. تزریق MMR ترین راه برای محافظت

باید (واکسن) MMR :

12 ی نی 4 الی 5 سالگی یرند.

2 واکسن MMR ی مقابل سرخکان حفاظت حاصل نموده اید یا به سرخک اید، در برابر سرخک محافظه می ید.

من مطمئن نیستم که آیا من قبلاً واکسن یا خیر؟

اگر مطمئن نیستید که آیا MMR تزریق شده است، می توانید سوابق خود را با دکتر خود بررسی کنید. دوباره تزریق شود این نیز دارید شویید با دکتر یا () صحت عامه صحبت کنید - مهم نیست که چی

اگر من فکر می کنم کسی در خانواده من سرخکان دارد چه کاری می دهم
بلافاصله با دکتر خود تماس بگیرید

هر چه زودتر آنها دیده شود برایشان بهتر . را در خانه نگه دارید و بازدید ها سازید
به خانه شما، مگر اینکه آنها بدانند که سرخک (MMR) رفته اند یا سابقه قبلی سرخک (۱۴) .

اگر خانواده ام با کسی که مبتلا به سرخک تماس داشته، چه کنم؟

هر یا کلان سال زیر 40 سالگی که واکسن مکمل نشده و یا هرگز سر ک نداشته باید فوراً واکسن (به صورت 3) .

اطفال بین 1 5 ساله که کودک بود یک یا MMR داشته باشند باید برای دومین MMR خود به دکتر خویش مراجعه نمایند.

برای نوزادان بین 6 ماه و یک سال تزریق MMR اولی به زودی می 12 گی نیاز داشته می .

در این مورد دکتر را بنگرید.

واکسن سوالی یا نگرانی دارید، با دکتر یا اداره صحتی محل خویش برای HSE تماس بگیرید. معافیت یا خط

HSE : 1850 18 1850

های دفتر صحتی محلی بین وبسایت :

<http://www.hse.ie/eng/services/list/1/LHO/>

سپاسگزاری:

صحتی، ک رک و کیری

عامه HSE / Dublin / Mid-Leinster / Tullamore.

تاریخ انتشار: 2017