

თქვენი ბავშვის ვაქცინები

ინფორმაცია მშობლებისა და მეურვეებისთვის, რომლებიც ჩავიდნენ ირლანდაში სხვა ქვეყნებიდან

ამ ბროშურაში ნახავთ ინფორმაციას თქვენი ბავშვის ვაქცინების შესახებ. ვაქცინები ეხმარება თქვენს შვილს ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში, იცავს მას პრევენციის შესაძლებლობის მქონე ინფექციური დაავადებებისგან. ირლანდის ჯანდაცვის სამსახური (Health Service Executive) ქმნის ვაქცინაციის გზაგადასასვლელს, რათა შესთავაზონ ვაქცინაცია კლნიკების მეშვეობით ზოგიერთადმიანს ვაქცინას შესთავაზებენ მოხილური ვაქცინაციის ჯგუფები. კომპენსირების ვაქცინაციის ჯგუფს წევრი შეიძლება დგინდებოდეს თქვენი შვილის ვაქცინაციის შესახებ.

რატომ არის ვაქცინები მნიშვნელოვანი?

ვაქცინები იცავს ჩვილებს და ბავშვებს ინფექციებისგან, რამაც შეიძლება ისინი მძიმედ დაავადდნ. ძალიან პატარა ჩვილები ყველზე მეტად არიან ამ ინფექციების რისკის ქვეშ, ამიტომ ვაქცინები იწყება რაც შეიძლება ადრე.

ირლანდაში ვაქცინაციის განრიგი იწყება 2 თვის ასაკიდან და რეკომენდებული ვაქცინები ტარდება 5-ზე მეტი ვიზიტით ჯანდაცვის ექიმთან (მას ეწოდება ზოგად პრაქტიკოსი ანუ GP), როდესაც თქვენი ბავშვი არის 2, 4, 6, 12 და 13 თვის ასაკში. ირლანდაში ჩვილებისთვის მიცემულ ვაქცინები იცავს მათინფექციებისგან, რომლებიც გავრცელებულია ან ძალიან სერიოზულია ირლანდაში.

2 თვე	ვიზიტი 1	6 1-ში + PCV + MenB + როტავირუსი 3 ინექცია + პერორალური წვეთები
4 თვე	ვიზიტი 2	6 1-ში + MenB + როტავირუსი 2 ინექცია + პერორალური წვეთები
6 თვე	ვიზიტი 3	6 1-ში + PCV + MenC 3 ინექცია
12 თვე	ვიზიტი 4	MMR + MenB 2 ინექცია
13 თვე	ვიზიტი 5	Hib/MenC + PCV 2 ინექცია

რომელ ვაქცინებზეა რეკომენდებული ირლანდაში?

ბავშვებისთვის რეკომენდებულია ვაქცინები, რათა დიცვან ისინი ინფექციებისგან, რომლებიც გავრცელებულია ირლანდაში და რამაც შეიძლება ისინი სერიოზულად დაავადდნ.

რა განსხვავებაა სხვა ქვეყნებში გაკეთებულ ვაქცინებსა და ირლანდაში გაკეთებულ ვაქცინებს შორის?

მრავალ ვაქცინა, რომელიც ირლანდაში კეთდება, ასევე კეთდება ბევრ სხვა ქვეყანაშიც. მაგალითად შეეტეს ქვეყნებში ბავშვებს სთავაზობენ დიფთერიის, პოლიომიელების, ტეტანუსისა და წითელს საწინააღმდეგო ვაქცინებს.

შეიძლება არსებობდეს განსხვავებები ირლანდაში რეკომენდებული ზოგიერთ ვაქცინისთვის, სხვა ქვეყნებთან შედარებით ეს იმიტომ ხდება, რომ შეიძლება არსებობდეს განსხვავებები ირლანდაში გავრცელებულ დაავადებებსა და სხვა ქვეყნებში გავრცელებულ დაავადებებს შორის. მაგალითად ირლანდაში ვაძლევთ ვაქცინას, რომელიც ბავშვებს იცავს მენინგოკოკური B და C დაავადებისგან. ამ ინფექციებმა შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი და სეპტიცემია. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ვაქცინები არარის იმუნიზაციის განრიგის ნაწილი. მაგრამ ისინი რეკომენდებულია ირლანდაში ბავშვების დასაცავად ძალიან სერიოზული ინფექციებისგან.

ჩემს შვილს ყველ ვაქცინა სხვა ქვეყანაში ჰქონდა გაკეთებული. რატომ სჭირდება მას სხვა ვაქცინები ახლ, როდესაც ის ირლანდაშია?

იმის გამო, რომ თქვენი შვილი ახლ ირლანდაში ცხოვრობს, მან უნდა დიცვას ირლანდის ვაქცინაციის გრაფიკი. ირლანდაში რეკომენდებული ვაქცინები იცავს ბავშვებს იმ დაავადებებისგან, რომლებიც გავრცელებულია ირლანდაში ან რომლებსაც შეიძლება სერიოზული შედეგები მოჰყვეს.

თქვენი შვილი უნდა „დექიოს“ ირლანდაში რეკომენდებულ ვაქცინებს. მას არსჭირდება ვაქცინების გამეორება, რომლებიც უკვე მიიღოს სხვა ქვეყანაში.

რა დაავადებებისგან იცავს თქვენს შვილს ეს დამატებითი ვაქცინები?

როტავირუსის პერორალური ვაქცინა

როტავირუსი არის ვირუსული ინფექცია, რომელიც იწვევს დარეას და ლებინებას ჩვილებში და მცირეწლოვან ბავშვებში. ბავშვების უმეტესობა გამოუჩნდრთულება სახლში, მაგრამ ზოგიერთს სჭირდება საავადმყოფოში გადაყვანა. ყოველწლიურად ირლანდაში 5 წლამდე ასაკის დაახლოებით 880 ბავშვი მოჰყავდათ საავადმყოფოში როტავირუსის ინფექციით სანამ როტავირუსის ვაქცინა იქნებოდა შემოღებული. ეს რიცხვი მკვეთრად შემცირდა როტავირუსის ვაქცინის შემოღების შემდეგ.

როტავირუსის ვაქცინა შეიძლება მიეცეს მხოლოდ 8 თვემდე ასაკის ჩვილებს.

მენინგოკოკის B (MenB) ვაქცინა

MenB ვაქცინა ეხმარება თქვენი შვილის დაცვას მენინგოკოკური B დაავადებისგან. ამ სერიოზულმა ბაქტერიულმა ინფექციამ შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი (თავის ტვინის გარსის ანთება) და სეპტიცემია (სისხლის მოწამვლა). მენინგოკოკური B ინფექცია იწვევს ირლანდაში მცირეწლოვან ბავშვებში მენინგიტით გამოწვეულ ინფექციების უმეტესობას და სიკვდილანობას. MenB ვაქცინა არკეთდება 2 წლის შემდეგ.

მენინგოკოკური C ინფექციის (MenC) ვაქცინა

MenC ვაქცინა ეხმარება თქვენი შვილის დაცვას მენინგოკოკური C დაავადებისგან. ეს არის ასევე სერიოზული ბაქტერიული ინფექცია, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი (თავის ტვინის გარსის ანთება) და სეპტიცემია (სისხლის მოწამვლა). ასევე შეიძლება იყოს სხვა

ვაქცინები, რომლებიც რეკომენდებულია თქვენი ბავშვისთვის. თქვენი ექიმი ან ექთანი მოგცემთ რჩევას ამის შესახებ.

პნევმოკოკური ინფექციის (PCV13) ვაქცინა

PCV13 ვაქცინა იცავს პნევმოკოკის ბაქტერიით გამოწვეულ დაავადებებისგან.

ამ ბაქტერიამ შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი (თავის ტვინის გარსის ანთება), პნევმონია (ფილტვის ინფექცია) ან სეპტიცემია (სისხლის მოწამვლა).

რა არის ამ ვაქცინების გვერდითი მოვლენები?

ვაქცინაციის შემდეგ გვერდითი მოვლენები უნდა გაგრძელდეს მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში

menB ვაქცინის შემდეგ თქვენს ბავშვს შეიძლება განუითარდეს სიცხე (მაღალი ტემპერატურა) ან შეიძლება ჰქონდეს დისკომფორტი, სიწითლე და შეშუპება ინექციის ადგილზე.

menC ვაქცინის შემდეგ თქვენს ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს დისკომფორტი, სიწითლე და შეშუპება ინექციის ადგილზე, ან ჰქონდეს სიცხე ან იყოს გაღიზიანებული.

როტავირუსის ვაქცინის შემდეგ თქვენს შვილს შეიძლება ჰქონდეს მსუბუქი დარეა. ძალიან იშვიათად შეიძლება ჰქონდეს მუცლის ტკივილი ან გამონაყარი.

სად შემიძლია ჩემი ბავშვის აცრა?

ირლანდაში ოჯახის ექიმები (GP-ები) ან მიგრანტების კომპენსირების ვაქცინაციის პროგრამა ახორციელებს ვაქცინაციას **ლჯუილი** და დცვაზე განაცხადის მქონე ბავშვებისთვის.

პრაქტიკოსი ექთანი ჩვეულებრივ უწევთ ბავშვებს ვაქცინებს, ოჯახის ექიმის ხელმძღვანელობით შეიძლება იყოს სხვა კლინიკები, რომლებიც ორგანიზებულია ჯანდაცვის სამსახურის მიერ, რათა ბავშვებს მისცენ მათთვის საჭირო ვაქცინები.

როგორ დავნიშნო შეხვედრა ოჯახის ექიმთან?

თქვენ უნდა დაჯავშნოთ შეხვედრა ოჯახის ექიმთან, ინფორმაციისთვის, თურგორიპოვოთ ოჯახის ექიმი, იხილეთ ინფორმაცია ბმულზე <https://www2.hse.ie/services/find-a-gp/>.

თუ არ გაყავთ ოჯახის ექიმი, ადგილობრივი კომპენსირების ვაქცინაციის **ჯგუფი** დგკავშირდებათ

რა ხდება ვაქცინაციის ვიზიტზე?

ვაქცინების გაკეთებამდე ადგილობრივი კომპენსირების ვაქცინაციის **ჯგუფის** წევრი, ოჯახის ექიმი ან პრაქტიკოსი ექთანი გაგესაუბრებათ იმ ვაქცინების შესახებ, რომლებიც თქვენს ბავშვს სჭირდება და დგელპარაკებით თუ უფაქცინაზე. ვაქცინების გაკეთების შემდეგ

ადგილობრივი კომპენსირების ვაქცინაციის **ჯგუფის** წევრი, ოჯახის ექიმი ან პრაქტიკოსი ექთანი მოგცემთ „ვაქცინის პასპორტს“, დგუქენტს, რომელშიც დტალწრადიქნება აღწერილი თქვენი ბავშვისთვის გაკეთებული ვაქცინები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეინახოთ თქვენი ვაქცინის

პასპორტი, როგორც თქვენი ბავშვის ვაქცინაციის ისტორიის ჩანაწერი. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩანაწერი თან იქონიოთ ვაქცინაციის შემდეგ ვიზიტებზე.

უნდა გადავიხადოთ ვაქცინაციის თანხა?

არა. ირლანდაში ვაქცინაცია უფასოა.

არის რეკომენდებული რაიმე ვაქცინა უფრთხილ ასაკის ბავშვებისთვის?

როდესაც ბავშვები სკოლაში დადიან, რეკომენდებულია მათთვის შემდეგი ვაქცინების გაკეთება

პატარა ბავშვები (ასაკი 5):

MMR და დოფტერიის, ტეტანუსის, ყივანახველს და პოლიომიელოტის ვაქცინების ბუსტერდოზა, რომლებიც შეთავაზებულია სკოლაში.

საშუალო სკოლის მე-6 კლასი (ასაკი 12):

HPV, MenACWY (მენინგოკოკური ACWY) და დოფტერიის, ტეტანუსის და ყივანახველს ვაქცინები შეთავაზებულია სკოლაში.

არის თუ არა რეკომენდებული რაიმე ვაქცინა ზრდასრულებისთვის?

დაახ. ზრდასრულებისთვის, რომლებსაც არ მიუღიათ ზოგიერთი ვაქცინა, რეკომენდებულია მათ მიღება. მაგალითად MMR ვაქცინა, რომელიც იცავს წითელს, ყბაყურას და წითურასგან, რეკომენდებულია ზრდასრულებისთვის, რომლებსაც არასოდეს მიუღიათ ეს ვაქცინა. გაესაუბრეთ ადგილობრივი კომპენსირების ვაქცინაციის ჯგუფს წევრს, თქვენს ოჯახის ექიმს (GP) ან ექთანს.

რამდენიმე შეკითხვა მაქვს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ვის შემოძლია გავესაუბრო?

ესაუბრეთ ადგილობრივი კომპენსირების ვაქცინაციის გუნდს წევრს, თქვენს ოჯახის ექიმს ან ექთანს. თუ სხვა კლნიკები არის ორგანიზებული ჯანდაცვის სამსახურის მიერ ბავშვების ვაქცინაციისთვის, შეგიძლიათ ასევე ესაუბროთ კლნიკების ექიმს ან ექთანს.

სად შეიძლება გავიგო მეტი?

ეწვიეთ www.immunisation.ie