

Вакцина MMR

Информация для родителей детей в возрасте 6 месяцев и старше, а также для взрослых

Как называется вакцина MMR?

Вакцина MMR называется Priorix или MMRVaxPro.

От каких болезней защищает вакцина MMR?

Вакцина MMR предназначена для защиты взрослых и детей от кори, паротита (свинки) и краснухи (германской кори).

Корь, свинка и краснуха – это чрезвычайно опасные инфекционные вирусные заболевания. Они распространяются путем передачи вируса от больного к тому, кто от него не защищен.

Заболевание	Общие симптомы	Возможные осложнения
Корь	Лихорадка Сыпь Покраснение глаз, боль в глазах	Энцефалит (отек головного мозга) Пневмония Бронхит Воспаление среднего уха
Свинка	Болезненные распухшие околоушные железы и лихорадка	Менингит Глухота Болезненное опухание яичек у взрослых мужчин
Краснуха (корь германская)	Лихорадка и сыпь	Если беременная женщина заболит краснухой, для ее малыша существует угроза приобретения врожденных пороков, таких как слепота, нарушение деятельности головного мозга, глухота, проблемы с сердцем и другие серьезные осложнения

Когда обычно вводится вакцина MMR?

В Ирландии дети получают первую дозу вакцины MMR в возрасте 12 месяцев. Вторая доза обычно вводится, когда ребенок достигает возраста 4–5 лет и посещает подготовительные классы. Две дозы вакцины MMR обеспечивают наилучшую защиту.

Если ваш ребенок ранее не был привит вакциной MMR, то первую дозу он должен получить как можно скорее, а вторую – через 1 месяц после первой.

Взрослые, которые не были привиты вакциной MMR, также должны получить первую дозу как можно скорее, а вторую – через 1 месяц после первой.

Близкие контакты с больными корью

Корь – чрезвычайно заразное заболевание. Если вы не вакцинированы или не перенесли корь в прошлом, высока вероятность того, что в случае контакта с больным вы заразитесь этим заболеванием. Если вы находились в близком контакте с больным корью, то врач может порекомендовать вам принять вакцину MMR. Это снизит вероятность развития кори.

Может ли ребенок младше 12 месяцев получить вакцину MMR?

RUSSIAN

Вакцина MMR (вспышка заболеваемости)

В случае вспышки заболеваемости корью врач может рекомендовать принятие вакцины MMR вашим ребенком начиная с возраста 6 месяцев. Это защитит его от кори. Если ребенок получил вакцину MMR в возрасте менее 12 месяцев, ему все равно нужно будет принять дозу этой вакцины, когда ему исполнится 12 месяцев. Это необходимо для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту. В этом случае еще одну дозу нужно будет принять в возрасте 4–5 лет.

Вакцина MMR обычно вводится в возрасте 12 месяцев, поскольку именно в это время она наиболее эффективна.

Женщинам, планирующим беременность

Если вы ранее никогда не принимали вакцину MMR и планируете забеременеть, то вам рекомендуется получить одну дозу вакцины MMR до наступления беременности. Это защитит вас от заражения краснухой во время беременности и уберезет вашего ребенка от серьезных осложнений.

Кому не следует получать вакцину MMR?

Вакцина MMR имеет минимальные противопоказания. Ее не следует принимать в следующих случаях:

- если наблюдалась тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую дозу вакцины MMR или на какую-либо ее составляющую;
- если наблюдалась тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на неомицин или глютин – вещества, которые являются компонентами вакцины MMR;
- ребенку младше 12 месяцев не рекомендуется принимать вакцину MMR, если его мать во время беременности принимала инфликсимаб;
- ребенку не рекомендуется принимать вакцину MMR в период грудного вскармливания, если его мать принимает инфликсимаб.

Если вы беременны, вам не следует принимать вакцину MMR. После приема вакцины рекомендуется отложить наступление беременности на 1 месяц. Вы можете безопасно кормить ребенка грудью после приема вакцины MMR.

Получение вакцины MMR нужно отложить, если вакцинируемый:

- болеет с высокой температурой;
- принимает в больших дозах медицинские препараты, называемые кортикостероидами;
- подвергается лечению химиотерапией или рентгенотерапией;
- имеет заболевание иммунной системы.

Вы можете уточнить у врача или медсестры, нужно ли вам в силу тех или иных причин отложить вакцинацию.

Есть ли связь между вакциной MMR и аутизмом?

Нет. Исследования показали, что между применением вакцины MMR и аутизмом нет никакой связи.

Есть ли у вакцины MMR побочные эффекты?

Большинство людей не испытывают проблем после принятия этой вакцины.

Иногда в месте инъекции могут возникнуть участки повышенной чувствительности, отека или покраснения.

В редких случаях через 6–10 дней после введения вакцины у детей может наблюдаться «миникорь», сопровождаемая высыпаниями на коже и повышением температуры.

Составлено: Национальный центр вакцинации HSE

Дата публикации: май 2022 г.

RUSSIAN

Вакцина MMR (вспышка заболеваемости)

На третьей неделе после вакцинации у детей может развиваться «мини-свинка» с характерной отечностью в области нижней челюсти.

Это состояние не является заразным и проходит через несколько дней.

Ребенку можно дать парацетамол или ибупрофен, чтобы снять боль или снизить температуру.

Дополнительная информация

Если у вас возникли вопросы о вакцинации, пожалуйста, обратитесь к вакцинатору, врачу или медсестре.

Посетите веб-сайт www.immunisation.ie, чтобы ознакомиться с дополнительной информацией о вакцинах. Посетите веб-сайт www.hpsc.ie, чтобы ознакомиться с дополнительной информацией об этих инфекционных заболеваниях.

Ссылки на информационные материалы о вакцинах также приведены на веб-сайте www.hpra.ie. Выполните поиск по ключевым словам «Priorix» или «MMRVaxPro» («MMR»), чтобы ознакомиться с соответствующим информационным листком пациента.