




UKRAINIAN

# Чого слід очікувати після вакцинації

## NEXT APPOINTMENT: НАСТУПНИЙ ВІЗИТ:

Вам із дитиною необхідно відвідати сімейного лікаря п'ять разів.


На кожен вакцинаційний візит до сімейного лікаря беріть із собою паспорт вакцинації дитини, щоб належним чином документувати прийом вакцин та мати можливість відстежити ці дані, коли дитина стане старшою.



**Пам'ятайте, що вам знадобиться парацетамол після вакцинації у віці 2 та 4 місяців.**

## Які поширені реакції можуть проявитися у моєї дитини після вакцинації та які мають бути мої дії?

Поширені реакції	Що робити
У 2 та 4 місяці (візити 1 та 2)	
Після прийому вакцини MenB часто виникає жар	<ul style="list-style-type: none"><li>Дайте дитячий парацетамол у формі суспензії</li><li>1. Першу дозу у кількості 2,5 мл (60 мг) слід дати під час вакцинаційного візиту або одразу після нього.</li><li>2. Другу дозу у кількості 2,5 мл (60 мг) слід дати через 4–6 годин після першої дози.</li><li>3. Третю дозу у кількості 2,5 мл (60 мг) слід дати через 4–6 годин після другої дози.</li><li>4. Дайте дитині четверту дозу через 4–6 годин після третьої дози, якщо її все ще буде турбувати жар.</li></ul>
Підвищена чутливість, набряклість і почервоніння в місці ін'єкції	Не надягайте на дитину одяг, який обтягує або натирає місце ін'єкції.
Легка діарея після вакцинації проти ротавірусної інфекції	Дайте дитині більше молока. <ul style="list-style-type: none"><li>Ретельно мийте руки після заміни підгузків малюка.</li></ul>
У 6, 12 та 13 місяців (візити 3, 4 та 5)	
Підвищена чутливість, набряклість і почервоніння в місці ін'єкції	Дайте парацетамол або ібупрофен, щоб зняти біль. <ul style="list-style-type: none"><li>Не надягайте на дитину одяг, який обтягує або натирає місце ін'єкції.</li></ul>
Жар (температура вище 39 °C)	<ul style="list-style-type: none"><li>Не надягайте на дитину багато одягу.</li><li>У приміщенні не має бути дуже жарко.</li><li>Давайте дитині більше рідини.</li><li>Дайте дитині парацетамол або ібупрофен, щоб збити жар.</li></ul>
Головний біль або дратівливість	Дайте парацетамол або ібупрофен, щоб зняти біль.



Якщо ваша дитина отримала вакцину MMR, то через 6–10 днів після вакцинації у неї може з'явитися висипання («мінікір»). Це не становить загрози для оточуючих.

**Пам'ятайте:** якщо після прийому вакцини самопочуття дитини значно погіршилося, це не обов'язково є наслідком вакцинації. Якщо ви стурбовані станом своєї дитини, будь ласка, зверніться за консультацією до сімейного лікаря або медсестри.

### Для отримання більш детальної інформації

- Будь ласка, прочитайте брошуру «Вакцинація дитини – інформація для батьків» (Your Child's Immunisation – A Guide for Parents)
- Додаткову інформацію про імунізацію можна отримати на вебсайті HSE: [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie)