

თქვენი ბავშვის ვაქცინები – ჩვილები, დაბადებული 2024 წ. 1 ოქტომბრის შემდეგ

ინფორმაცია მშობლებისა და მეურვეებისთვის, რომლებიც ჩამოვიდნენ ირლანდიაში სხვა ქვეყნებიდან.

ამ ბროშურაში ნახავთ ინფორმაციას თქვენი ბავშვის ვაქცინების შესახებ. ვაქცინები ეხმარება თქვენს შვილს ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში, იცავს მას პრევენციის შესაძლებლობის მქონე ინფექციური დაავადებებისგან.

რატომ არის ვაქცინები მნიშვნელოვანი?

ვაქცინები იცავს ჩვილებს და ბავშვებს ინფექციებისგან, რამაც შეიძლება ისინი მძიმედ დაავადოს. ძალიან პატარა ჩვილები ყველზე მეტად არიან ამ ინფექციების რისკის ქვეშ, ამიტომ ვაქცინები იწყება რაც შეიძლება ადრე. ირლანდიაში ვაქცინაციის განრიგი იწყება 2 თვის ასაკიდან და რეკომენდებული ვაქცინები ტარდება 5 ვიზიტზე, ჩვეულებრივ, თქვენს ოჯახის ექიმთან, როდესაც თქვენი ბავშვი არის 2, 4, 6, 12 და 13 თვის ასაკში. ირლანდიაში ჩვილებისთვის მიცემული ვაქცინები იცავს მათ ინფექციებისგან, რომლებიც გავრცელებულია ან ძალიან სერიოზულია ირლანდიაში.

რომელ ვაქცინებია რეკომენდებული ირლანდიაში?

ბავშვებისთვის რეკომენდებულია ვაქცინები, რათა დაიცვან ისინი ინფექციებისგან, რომლებიც გავრცელებულია ირლანდიაში ან რამაც შეიძლება ისინი ძალიან ავად გახადოს.

ვიზიტი	ვაქცინის განრიგი	გაკეთებული ვაქცინები
ვიზიტი 1	2 თვე	6 1-ში + PCV + MenB + როტავირუსი* 3 ინექცია + პერორალური წვეთები
ვიზიტი 2	4 თვე	6 1-ში + MenB + როტავირუსი 2 ინექცია + პერორალური წვეთები
ვიზიტი 3	6 თვე	6 1-ში + PCV 2 ინექცია
ვიზიტი 4	12 თვე	MMR+MenB+ჩუტყვავილ 3 ინექცია
ვიზიტი 5	13 თვე	6 1-ში + MenC + PCV 3 ინექცია

*როტავირუსის ვაქცინა არ მიეცემა 8 თვის და 0 დღის ასაკში ან მის შემდეგ

რა განსხვავებაა სხვა ქვეყნებში გაკეთებულ ვაქცინებსა და ირლანდიაში გაკეთებულ ვაქცინებს შორის?

მრავალ ვაქცინა, რომელიც ირლანდიაში კეთდება, ასევე კეთდება ბევრ სხვა ქვეყანაშიც. მაგალითად, უმეტეს

ქვეყნებში ბავშვებს სთავაზობენ დიფტერიის, პოლიომიელიტის, ტეტანუსისა და წითელს საწინააღმდეგო ვაქცინებს.

შეიძლება არსებობდეს განსხვავებები ირლანდიაში რეკომენდებულ ზოგიერთ ვაქცინისთვის, სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ეს იმიტომ ხდება, რომ შეიძლება არსებობდეს განსხვავებები ირლანდიაში გავრცელებულ დაავადებებსა და სხვა ქვეყნებში გავრცელებულ დაავადებებს შორის.

მაგალითად, ირლანდიაში ვაძლევთ ვაქცინას, რომელიც ბავშვებს იცავს მენინგოკოკური B და C დაავადებისგან. ამ ინფექციებმა შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი და სეპტიცემია. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ვაქცინები არ არის იმუნიზაციის განრიგის ნაწილი. მაგრამ ისინი რეკომენდირებულია ირლანდიაში ბავშვების დასაცავად მაღალან სერიოზულ ინფექციებისგან.

ჩემს შვილს ყველ ვაქცინა სხვა ქვეყანაში ჰქონდა გაკეთებული. რატომ სჭირდება მას სხვა ვაქცინები ახლ, როდესაც ის ირლანდიაშია?

იმის გამო, რომ თქვენი შვილი ახლ ირლანდიაში ცხოვრობს, მან უნდა დაიცვას ირლანდიის ვაქცინაციის გრაფიკი. ირლანდიაში რეკომენდებულ ვაქცინები იცავს ბავშვებს იმ დაავადებებისგან, რომლებიც გავრცელებულია ირლანდიაში, ან რამაც შეიძლება ისინი ძალიან ავად გახადოს.

თქვენი შვილი უნდა „დაეწიოს“ ირლანდიაში რეკომენდირებულ ვაქცინებს. მას არ სჭირდება ვაქცინების გამეორება, რომლებიც უკვე მიიღო სხვა ქვეყანაში.

რა დაავადებებისგან იცავს თქვენს შვილს ეს დამატებითი ვაქცინები?

როტავირუსის პერორალური ვაქცინა

როტავირუსი არის ვირუსული ინფექცია, რომელიც იწვევს დიარეას და ღებინებას ჩვილებში და მცირეწლოვან ბავშვებში. ბავშვების უმეტესობა გამოჯანმრთელდება სახლში, მაგრამ ზოგიერთს სჭირდება საავადმყოფოში გადაყვანა.

ყოველწლიურად ირლანდიაში 5 წლამდე ასაკის დაახლოებით 880 ბავშვი მოჰყავდათ საავადმყოფოში როტავირუსის ინფექციით, სანამ როტავირუსის ვაქცინა იქნებოდა შემოღებული. ეს რიცხვი მკვეთრად შემცირდა როტავირუსის ვაქცინის შემოღების შემდეგ. როტავირუსის ვაქცინა შეიძლება მიეცეს მხოლოდ მთელ ასაკის ჩვილებს.

მენინგოკოკის B (MenB) ვაქცინა

MenB ვაქცინა ეხმარება თქვენი შვილის დაცვას მენინგოკოკური B დაავადებისგან. ამ სერიოზულმა ბაქტერიულმა ინფექციამ შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი (თვის ტვინის გარის ანთება) და სეპტიცემია (სისხლს მოწამვლა). მენინგოკოკური B ინფექცია იწვევს ირლანდიაში მცირეწლოვან ბავშვებში მენინგიტით გამოწვეულ

ინფექციების უმეტესობას და სიკვდილობას. MenB ვაქცინა, ჩვეულებრივ, არ მიეცემა 2 წლის ასაკის შემდეგ.

მენინგოკოკური C ინფექციის (MenC) ვაქცინა

MenC ვაქცინა ეხმარება თქვენი შვილის დაცვას მენინგოკოკური C დაავადებისგან. ეს არის ასევე სერიოზული ბაქტერიული ინფექცია, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი (თავის ტვინის გარსის ანთება) და სექტიცემია (სისხლის მოწამვლა).

პნევმოკოკური (PCV) ვაქცინა

PCV ვაქცინა იცავს პნევმოკოკის ბაქტერიით გამოწვეულ დაავადებებისგან. ამ ბაქტერიამ შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი (თავის ტვინის გარსის ანთება), პნევმონია (ფილტვის ინფექცია) ან სექტიცემია (სისხლის მოწამვლა). PCV ვაქცინა, ჩვეულებრივ, არ მიეცემა 2 წლის ასაკის შემდეგ.

ჩუტყვა ვილ (ვარიცელ)

ჩუტყვა ვილ გამოწვეულია ძალიან გადამდები ვირუსით. ეს იწვევს ბუშტუკოვან გამონაყარს ქავილთა და სხვა სიმპტომებს, როგორცაა სიცხე და ცუდადყოფნის შეგრძნება. ჩუტყვა ვილს შეუძლია გამოიწვიოს უფრო სერიოზული დაავადებები, როგორცაა ენცეფალოტი (თავის ტვინის ანთება), პნევმონია (ფილტვის ინფექცია) და მიოკარდიტი (გულს ანთება).

რა არის ამ ვაქცინების გვერდითი მოვლენები?

ვაქცინების შემდეგ გვერდითი მოვლენები ჩვეულებრივ მსუბუქია და გრძელდება მხოლოდ რამდენიმე დღე.

- სიცხე (მაღალი ტემპერატურა) ხშირია MenB ვაქცინის შემდეგ. გთხოვთ, თან იქონიოთ ჩვილის თხევადი პარაცეტამოლი თქვენს პირველ ორ ვიზიტზე, თუ თქვენი შვილი იკეთებს MenB ვაქცინას. ეს დაეხმარება სიცხეს.
- ზოგჯერ ბავშვებს შეიძლება აღენიშნებოდეთ ტკივილი, შეშუპება და სიწითლე იმ ადგილს, სადაც ინექცია გაუკეთეს. დარწმუნდით, რომ ტანსაცმელი არ არის ძალიან მჭიდრო.
- მსუბუქი დიარეა ნორმალურია როტავირუსის ორალური ვაქცინის შემდეგ. მიეცით თქვენს ბავშვს ბევრი რძე. ფრთხილად დაიბანეთ ხელები ბავშვის საფენის გამოცვლასა და გადგების შემდეგ.
- ჩახუტება და კვება დაეხმარება თქვენს ბავშვს თავი უკეთიგრძნოს ვაქცინაციის შემდეგ.
- ზოგჯერ ბავშვებს უვითარდებათ მსუბუქი გამონაყარი რამდენიმე ლქით ჩუტყვა ვილს ვაქცინის შემდეგ. ეს შეიძლება გაგრძელდეს 5-26 დღის განმავლობაში ვაქცინაციის შემდეგ. გამონაყარი თავისით გადაის და არ საჭიროებს მკურნალობას. თუ თქვენს შვილს გამოუვლნდება ეს გამონაყარი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ მეტი აქან გაესაუბროთ თქვენს ექთანს ან ექიმს.

სად შემიძლია ჩემი ბავშვის აცრა?

ირლანდიაში ოჯახის ექიმები (GP-ები) უზრუნველყოფენ ბავშვების ვაქცინაციას. პრაქტიკოსი ექთანი ჩვეულებრივ უკეთებს ბავშვებს ვაქცინებს, ოჯახის ექიმის ხელმძღვანელობით. შეიძლება იყოს სხვა კლინიკები, რომლებიც ორგანიზებულია ჯანდაცვის სამსახურის მიერ, რათა ბავშვებს მისცენ მათთვის საჭირო ვაქცინები. მაგალითად, ირლანდიის ჯანდაცვის სამსახურის (HSE) ექთნები და ექიმები აწყოფენ კლინიკებს ბავშვების ვაქცინაციის მიზნით, რომლებიც არიან ლტოლვილები ან დაცვის შესახებ განმცხადებლები.

როგორ და ვნიშნო შეხვედრა ოჯახის ექიმთან?

თქვენ უნდა დაჯავშნოთ შეხვედრა GP-სთან. იმის გასაგებად, თუ როგორ უნდა იპოვოთ GP, იხილეთ ინფორმაცია აქ. თუ არ გყავთ GP, ადგილობრივმა HSE ვაქცინაციის ჯგუფმა შეიძლება მოაწყოს კლინიკები, სადაც თქვენი ბავშვის აცრა იქნება შესაძლებელი.

რა ხდება ვაქცინაციის ვიზიტზე?

ვაქცინების გაკეთებამდე ექთანი ან ექიმი გაგესაუბრებათ თქვენი შვილისთვის საჭირო ვაქცინების შესახებ და მოგიყვებათ თითოეულ ვაქცინაზე. ვაქცინების მიღების შემდეგ თქვენ მიიღებთ "ვაქცინის პასპორტის" დოკუმენტს, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი თქვენი ბავშვისთვის გაკეთებული ვაქცინები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოდ შეინახოთ ვაქცინის პასპორტი, როგორც თქვენი შვილის ვაქცინების ჩანაწერი. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩანაწერი თან იქონიოთ ვაქცინაციის შემდგომ ვიზიტებზე.

უნდა გადავიხადო ვაქცინაციის თანხა?

არა. ირლანდიაში ვაქცინაცია უფასოა.

არის რეკომენდებული რაიმე ვაქცინა უფრო დიდასაკის ბავშვებისთვის?

როდესაც ბავშვები სკოლაში არიან, რეკომენდებულია მათთვის ვაქცინების გაკეთება.

პატარა ბავშვები (ასაკი 5): MMRV ვაქცინა, რომელიც იცავს წითელს, ყბაყურას, წითურას და ჩუტყვავილესგან და დიფტერიის, ტეტანუსის, ყივანახველს და პოლიომიელიტის ვაქცინების გამაძლიერებელი დოზა. ეს ვაქცინები შეთავაზებულია სკოლაში.

საშუალო სკოლის მე-6 კლასი (ასაკი 12): HPV, MenACWY (მენინგოკოკური ACWY) და დიფტერიის, ტეტანუსის და ყივანახველს გამაძლიერებელი დოზა. ეს ვაქცინები ეძლევა სკოლაში.

არის თუ არა რეკომენდებული რაიმე ვაქცინა ზრდასრულებისთვის?

დიახ. ზრდასრულებისთვის, რომლებსაც არ მიუღიათ ზოგიერთი ვაქცინა, რეკომენდებულია მათი მიღება. მაგალითად, MMR ვაქცინა, რომელიც იცავს წითელს, ყბაყურას და წითურასგან,



რეკომენდებულია ზრდასრულებისთვის, რომლებსაც არასოდეს მიუღიათ ეს ვაქცინა. ესაუბრეთა დოქტორი HSE ვაქცინაციის გუნდის წევრს, თქვენს GP-ს ან ექთანს.

რამდენიმე შეკითხვა მაქვს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ვის შემთხვევაში გავესაუბრო?
ესაუბრეთა დოქტორი HSE ვაქცინაციის გუნდის წევრს, თქვენს GP-ს ან პრაქტიკოს ექთანს. თუ სხვა კლინიკების არის ორგანიზებული ჯანდაცვის სამსახურის მიერ ბავშვების ვაქცინაციისთვის, შეგიძლიათ ასევე ესაუბროთ ამ კლინიკების ექიმს ან ექთანს.

მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.immunisation.ie