

Vaccin 6-en-1

Brochure informative destinée aux parents

Qu'est-ce que le vaccin 6-en-1 ?

Le vaccin 6 en 1 protège votre nourrisson contre six maladies : la diphtérie, l'hépatite B, l'haemophilus influenzae type b (Hib), la coqueluche, la polio et le tétanos.

En quoi consistent ces maladies ?

La diphtérie est une infection bactérienne qui peut provoquer un encombrement du nez, de la gorge ou des voies aériennes.

Symptômes : maux de gorge, fièvre, migraines et accélération du rythme cardiaque.

Complications éventuelles : difficultés respiratoires sévères, insuffisance cardiaque ou paralysie.

L'hépatite B est une infection virale qui affecte le foie et peut être à l'origine d'une infection à vie.

Complications éventuelles : cirrhose, cancer ou insuffisance hépatique.

Le Hib est une infection bactérienne qui peut entraîner une méningite (inflammation de la membrane qui entoure le cerveau), une septicémie (empoisonnement du sang), une épiglottite (gonflement de la gorge) et des otites.

Symptômes : fièvre, vomissements, migraines et raideur de la nuque.

La coqueluche est une infection bactérienne qui entraîne une toux irritante qui s'aggrave progressivement. Cette infection s'accompagne d'un son semblable au « chant du coq ».

Symptômes : toux et vomissements,

Complications éventuelles : difficultés respiratoires sévères, pneumonie, attaques et dommages cérébraux.

La polio est une infection virale qui affecte le système nerveux et peut être à l'origine d'une paralysie.

Le tétanos (blocage de la mâchoire) est une maladie qui entraîne des spasmes musculaires douloureux, des convulsions et des difficultés respiratoires. Elle est potentiellement mortelle.

Toutes les infections décrites ci-dessus sont des maladies graves potentiellement mortelles.

À qui administrer le vaccin 6-en-1 ?

Les nourrissons de 2, 4 et 6 mois reçoivent le vaccin 6-in-1. Il est donc fortement recommandé d'emmener votre enfant chez votre médecin généraliste pour le faire vacciner gratuitement.

N'est-il pas dangereux d'administrer plusieurs vaccins en même temps ?

Non, ce n'est pas dangereux. Les vaccinations sont planifiées pour donner la meilleure protection à votre enfant.

Quels symptômes peuvent se manifester après la vaccination ?

Certains enfants peuvent ressentir de l'inconfort, éventuellement accompagné de rougeurs et d'un gonflement sur le site de l'injection.

Votre enfant peut être irritable et avoir de la fièvre. Dans ce cas, vous pouvez lui administrer du paracétamol ou de l'ibuprofène.

Il doit également boire beaucoup. Assurez-vous qu'il n'a pas trop chaud et que ses vêtements ne frottent pas le site d'injection.

Quels sont les enfants qui ne doivent pas recevoir le vaccin 6-en-1 ?

Le vaccin 6-en-1 n'est pas dangereux pour la plupart des enfants. Toutefois, votre enfant ne doit pas être recevoir ce vaccin s'il a fait une véritable réaction allergique (anaphylaxie) à une dose précédente ou à tout composant du vaccin.

Si vous vous inquiétez pour votre enfant, contactez immédiatement votre médecin de famille.

Pour plus d'informations

- Contactez votre médecin de famille ou une infirmière de la santé publique.
- Procurez-vous un exemplaire de « Your Child's Immunisations – A Guide for Parents » disponible auprès de votre infirmière de santé publique.