

Vacina 6 em 1

Folheto Informativo para os Pais

O que é a vacina 6 em 1?

A vacina 6 em 1 protege o seu bebé contra seis doenças: difteria, hepatite B, Haemophilus influenzae tipo B (Hib), tosse convulsa, poliomielite e tétano.

O que são estas doenças?

Difteria é uma infeção bacteriana que provoca o desenvolvimento de uma membrana de pus no nariz, garganta ou vias respiratórias.

Sintomas: dor de garganta, febre, dor de cabeça e aceleração da frequência cardíaca.

Possíveis complicações: problemas respiratórios graves, falência cardíaca ou paralisia.

Hepatite B é uma infeção viral que afeta o fígado e pode causar infeções para toda a vida.

Possíveis complicações: cirrose, cancro ou falha do fígado.

A Hib é uma infeção bacteriana que pode causar meningite (inflamação das membranas que envolvem o cérebro), septicemia (envenenamento do sangue), epiglotite (inchaço da garganta) e otites.

Sintomas: febre, vômitos, dor de cabeça e rigidez do pescoço.

Tosse convulsa é uma infeção bacteriana que causa uma tosse irritante que piora gradualmente. Pode ser caracterizada por um som do tipo 'guincho'.

Sintomas: tosse e vômitos,

Possíveis complicações: dificuldades respiratórias graves, pneumonia, convulsões e lesões cerebrais.

Poliomielite é uma infeção viral que afeta o sistema nervoso e provoca a paralisia

Tétano ('trismo') é uma doença que causa espasmos musculares dolorosos, convulsões e dificuldades respiratórias. Pode ser fatal.

Todas as doenças acima referidas são muito graves e podem conduzir à morte.

Quem deve ser vacinado com a 6 em 1?

A vacinação 6 em 1 é administrada a bebés aos 2, 4 e 6 meses. Deverá levar o seu filho ao médico de família (GP) por forma a tomar a vacina gratuitamente.

É seguro tomar mais do que uma vacina ao mesmo tempo?

Sim, é seguro. As vacinas estão previstas para fornecer ao seu bebé a melhor proteção.

O que acontece após a vacina

Algumas crianças podem sentir desconforto, vermelhidão ou inchaço na zona onde foi administrada a injeção.

Poderão ficar irritáveis e ter febre. Se tal acontecer, poderá administrar-lhes paracetamol ou ibuprofeno infantil.

Deverá dar-lhes também bastantes líquidos. Certifique-se de que não estão demasiado quentes e de que as suas roupas não estão a friccionar a zona da injeção.

Quem não deve tomar a vacina 6 em 1?

A vacina 6 em 1 é segura para a maioria das pessoas. No entanto, o seu filho não deverá receber a vacina se tiver tido uma verdadeira reação alérgica (anafilaxia) a uma dose anterior ou a qualquer parte de uma vacina.

No caso de estar preocupado com o seu bebé, contacte imediatamente o seu médico de família.

Para obter mais informações

- Contacte o seu médico de família ou o enfermeiro de saúde pública
- Peça uma cópia de “A Vacinação do seu filho – Um guia para pais”, que poderá obter junto do seu enfermeiro de saúde pública.