

Вакцина «6 в 1»

Информационная брошюра для родителей

Что такое вакцина «6 в 1»?

Вакцина «6 в 1» защищает Вашего ребенка от шести заболеваний: дифтерии, гепатита В, заболеваний, вызываемых *haemophilus influenzae* типа В (Hib), коклюша, полиомиелита и столбняка.

Чем опасны эти заболевания?

Дифтерия – это бактериальная инфекция, которая может вызвать отечность носа, горла или дыхательных путей.

Симптомы: боль в горле, лихорадка, головная боль и учащенное сердцебиение. Возможные осложнения: серьезные проблемы с органами дыхания, сердечная недостаточность или паралич.

Гепатит В – это вирусная инфекция, которая поражает печень и может вызвать заболевание на всю жизнь.

Возможные осложнения: цирроз, рак печени или печеночная недостаточность.

Hib – это бактериальная инфекция, которая может вызвать менингит (воспаление мозговых оболочек), сепсис (заражение крови), эпиглоттит (опухоль в горле) и ушные инфекции.

Симптомы: лихорадка, рвота, головная боль и ригидность затылочных мышц.

Коклюш – это бактериальная инфекция, которая вызывает раздражающий кашель, постепенно становящийся сильнее. Также может проявляться характерный коклюшный кашель.

Симптомы: кашель и рвота.

Возможные осложнения: серьезные проблемы с органами дыхания, пневмония, судороги и повреждение головного мозга.

Полиомиелит – это вирусная инфекция, поражающая нервную систему и вызывающая паралич.

Столбняк – это заболевание, которое вызывает болезненные мышечные спазмы и может стать причиной судорог и затрудненного дыхания. Может привести к смерти.

Все перечисленные заболевания очень серьезны и могут привести к смертельному исходу.

Кого следует прививать вакциной «6 в 1»?

Вакциной «6 в 1» дети прививаются в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. Необходимо привести ребенка к семейному врачу, чтобы бесплатно получить вакцину.

Безопасно ли совмещение нескольких вакцин?

Да, это безопасно. Вакцины синхронизированы таким образом, чтобы обеспечить наилучшую защиту для Вашего ребенка.

Чего следует ожидать после вакцинации

Некоторые дети могут чувствовать дискомфорт, в месте инъекции у них могут возникнуть покраснение и отечность.

Ребенок может стать раздражительным, у него может быть лихорадка. Если это произойдет, ребенку необходимо дать детский парацетамол или ибупрофен.

Ему также следует пить много жидкости. Убедитесь, что ребенок одет не слишком тепло, а одежда не натирает место инъекции.

Кого нельзя прививать вакциной «6 в 1»?

Вакцина «6 в 1» безопасна для большинства людей. Однако Ваш ребенок не должен ее получать, если у него была положительная аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую вакцину или на любую ее составляющую.

Если у Вас возникли сомнения относительно состояния Вашего ребенка, немедленно свяжитесь с Вашим врачом.

Дополнительная информация

- Обратитесь к своему семейному врачу или участковой медсестре.
- Получите у своей участковой медсестры экземпляр брошюры «Your Childs Immunisations – A Guide for Parents» («Вакцины для Вашего ребенка – справочник для родителей»).