

لقاح MenC نشرة معلومات للآباء

ما هو مرض المكورات السحائية C؟

مرض المكورات السحائية C هو مرض خطير، وقد يكون مميتا في بعض الأحيان ويمكن أن يتسبب في التهاب السحايا والإنتان الدموي. تتضمن الأعراض الحمى وتيبس الرقبة والصداع وآلام المفاصل والطفح.

كيف ينتشر مرض المكورات السحائية C؟

تعيش البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا C في أنف وحلق الإنسان. يمكن للشخص الذي يحمل هذه البكتيريا أن ينشر المرض عن طريق السعال أو العطس أو حتى التنفس.

ما هي الأمراض التي يسببها؟

من الممكن أن يتسبب مرض المكورات السحائية C في أمراض خطيرة، منها:

- التهاب السحايا (التهاب الغشاء حول المخ)، وكذلك
- الإنتان الدموي (تسمم الدم)

من هم الأشخاص الأكثر تعرضا للخطورة من جراء ذلك المرض؟

مرض المكورات السحائية C يكون أكثر شيوعا بين الأطفال الأقل من خمسة أعوام. ويعتبر الأطفال الأقل من عام واحد أكثر عرضة للمرض بصفة خاصة. كما يشيع المرض أيضا بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما.

هل يوجد لقاح ضد مرض المكورات السحائية C؟

منذ عام 2000 تم إضافة لقاح المكورات السحائية C إلى برنامج تطعيمات الأطفال.

الأطفال الذين سيولدون في الأول من يوليو 2015 أو بعد هذا التاريخ ينبغي أن يحصلوا على لقاح المكورات السحائية C في سن 4 شهور مع جرعة إضافية عند سن 13 شهرا، في نفس الوقت مع اللقاحات الأخرى.

الأطفال الذين ولدوا قبل الأول من يوليو 2015 ينبغي أن يحصلوا على لقاح المكورات السحائية C في سن 4 و 6 شهور مع جرعة إضافية عند سن 13 شهرا، في نفس الوقت مع اللقاحات الأخرى.

لماذا تغيرت مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال؟

تغيرت مواعيد تطعيم المكورات السحائية C من ثلاث جرعات عند سن أربعة أشهر وستة أشهر و 13 شهرا إلى جرعتين عند سن أربعة أشهر و 13 شهرا.

سبب تغير المواعيد هو أننا توصلنا إلى أن جرعتين يحققان للأطفال نفس مستوى الحماية الذي تحققه ثلاث جرعات.

هل هناك خطورة من أخذ أكثر من لقاح في نفس الوقت؟

لا توجد خطورة من ذلك. فمواعيد إعطاء اللقاحات محددة بحيث تمنح طفلك أفضل وقاية.

هل يحتاج طفلي إلى جرعة تنشيطية من لقاح المكورات السحائية C؟

لمزيد من الحماية ضد الإصابة بمرض المكورات السحائية C ينبغي أن يتلقى طفلك جرعة تنشيطية ضد مرض المكورات السحائية C في سن 13 شهرا، في نفس الوقت مع لقاح المستديمة النزلية (Hib).

تعطى جرعة تنشيطية ثانية من لقاح المكورات السحائية C في السنة الأولى بالمرحلة الثانية.

ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح؟

قد يصاب بعض الأطفال بالضيق أو الاحمرار والتورم في موضع الحقن.

وقد يكون عصبيا بعض الشيء أو يصاب بالحمى. فإذا حدث هذا يمكنك إعطاؤهم باراسيتامول أو إيبوبروفين الخاصين بالأطفال.

يجب أن يتناولوا كمية كبيرة من السوائل. تأكد أن حرارتهم لم ترتفع بشكل كبير وأن ملابسهم لا تحتك بمكان الحقنة.

من الذي ينبغي ألا يتلقى لقاح المكورات السحائية C؟

يعد لقاح المكورات السحائية MenC لقاحا آمنا لغالبية الأشخاص. إلا أنه ينبغي ألا يأخذ طفلك اللقاح إذا كان لديه حساسية حقيقية (الغوار) ضد جرعة سابقة أو أحد مكونات اللقاح.

تذكر

لقاح المكورات السحائية C يقي فقط من التهاب السحايا والإنتان الدموي الناتجين عن مرض المكورات السحائية C.

هناك أسباب أخرى لالتهاب السحايا والإنتان الدموي، لذا عليك معرفة الأعراض حتى يمكنك تمييزها. ومن هذه الأعراض:

- الحمى،
- رفض الطعام،
- جلد شاحب أو مبرقش، أو به بقع أو طفح جلدي أو
- خمول أو صعوبة في الاستيقاظ.

إذا ساورك القلق بخصوص حالة طفلك، فاتصل بطبيب العائلة على الفور.

للمزيد من المعلومات

- اتصل بطبيب العائلة أو مرشد صحي عام
- احصل على نسخة من "دليل تطعيمات طفلك - دليل إرشاد الأبوين" المتوفر لدى المرشد الصحي العام.