

Întrebări frecvente

Răspunsuri la majoritatea întrebărilor puse de părinți

De ce se administrează vaccinurile la o vârstă atât de fragedă?

Vaccinurile sunt administrate la vârstă fragedă deoarece bebelușii sunt mai vulnerabili la aceste boli și trebuie protejați cât mai repede posibil. De exemplu, bebelușii care au mai puțin de 6 luni sunt cei mai expuși riscului de a suferi complicații grave în urma tusei convulsive (6 din 10 necesită spitalizare, iar 9 din 10 decese cauzate de tusea convulsivă se înregistrează în această categorie de vârstă). De obicei, trivaccinul ROR nu este prescris copiilor sub 12 luni deoarece este posibil să nu acționeze corespunzător.

Cât de grave sunt aceste boli?

Oricare dintre ele poate provoca moartea unui copil sau unui adult. Este ușor să uităm gravitatea acestor boli deoarece – în bună parte grație vaccinurilor – nu le vedem atât de mult cum eram obișnuiți.

Pojarul ucidea mii de oameni anual în Europa și în Statele Unite. În anii '40 și '50 ai secolului trecut, zeci de mii de copii au fost rămași cu sechele sau au murit din cauza poliomielitei. Recent, mai precis pe la jumătatea anilor '80, în fiecare an 100 de copii din Irlanda se îmbolnăveau de meningită și făceau alte complicații grave în urma infecției Hib.

Aceste boli nu s-au schimbat. Ele pot cauza în continuare pneumonie, sufocare, meningită, afecțiuni ale creierului și probleme cardiace în cazul copiilor care nu sunt protejați. Aceste boli continuă să ucidă copii în multe părți ale lumii, chiar și în Irlanda.

Sunt administrate prea multe vaccinuri?

Unii părinți se tem că administrarea câtorva vaccinuri simultan va suprasolicita sistemul imunitar al copilului sau că vaccinurile nu vor acționa cum trebuie. Totuși, nu trebuie să vă îngrijorați deoarece sistemul imunitar al copilului dumneavoastră poate face față cu ușurință vaccinurilor. Studiile au arătat că vaccinurile administrate simultan sunt tot atât de sigure și de eficiente ca și cele administrate separat. De exemplu, dacă i s-ar fi făcut injecții simple în locul vaccinului combinat ROR, copilul dumneavoastră ar fi fost expus mai mult timp riscului de a se îmbolnăvi de pojar, oreion și rubeolă și, în plus, i s-ar fi administrat șase injecții în loc de două.

O serie de injecții sunt necesare pentru a-i oferi copilului dumneavoastră cea mai mare protecție posibilă; prin urmare, este important să finalizați programul de vaccinare. Numărul de injecții scade dacă se utilizează vaccinuri combinate, adică mai multe vaccinuri sunt combinate într-o singură injecție.

Vârstele la care se recomandă vaccinurile sunt alese astfel încât copilul dumneavoastră să beneficieze de cea mai rapidă și mai bună protecție împotriva bolilor.

Își va mai face efectul imunizarea dacă copilul meu nu a beneficiat de ea la data corespunzătoare?

Da. Majoritatea vaccinurilor pot fi făcute la orice vârstă, iar copilul căruia nu i se face un vaccin din schema de vaccinare nu va trebui să reia programul de la capăt. Vaccinurile administrate deja continuă să-și facă efectul, iar copilul dumneavoastră va dezvolta în continuare imunitate. Pur și simplu adresați-vă medicului dumneavoastră de familie.

Copilul dumneavoastră trebuie să fie vaccinat la vârsta potrivită astfel încât să fie protejat de boli grave când este cel mai vulnerabil.

FACEȚI VACCINURILE LA TIMP DE FIECARE DATĂ

Ce se întâmplă dacă copilul meu nu face aceste vaccinuri?

În principiu, s-ar putea întâmpla unul din următoarele două lucruri:

- În cazul în care copilul dumneavoastră nu va fi expus niciodată pe parcursul vieții acestor boli, nu se va întâmpla nimic.
- În cazul în care copilul este expus la una dintre aceste boli, fie la vârsta copilăriei, fie ca adult, este foarte probabil că el sau ea se va îmbolnăvi.

Copilul dumneavoastră ar putea

- o să se îmbolnăvească ușor și să trebuiască să stea în casă câteva zile; sau
- o să se îmbolnăvească foarte grav și să necesite spitalizare sau, în cel mai nefericit caz, să înceteze din viață.

De asemenea, copilul dumneavoastră ar putea să răspândească aceste boli altora care nu sunt protejați, de exemplu copiilor care sunt încă prea mici pentru a fi vaccinați. Mulți oameni s-ar putea îmbolnăvi grav, iar unii chiar ar putea să moară dacă în comunitatea dumneavoastră nu sunt suficienți oameni protejați.

În ce măsură există riscul ca fiul sau fiica mea să fie expus acestor boli?

Întrucât unele dintre aceste boli sunt în prezent foarte rare în Irlanda, riscul de expunere este mic, însă alte boli sunt în continuare destul de frecvente. Unele boli sunt rare în Irlanda, dar frecvente în alte părți ale lumii și, ca urmare, copilul dumneavoastră ar putea contracta aceste boli când călătorește în străinătate.

Nu trebuie să presupuneți că copilul dumneavoastră este complet imun la boli, nici măcar la cele rare. Difteria se întâlnește încă în unele țări asiatice. În 2010, s-a înregistrat o epidemie de poliomielită în Europa de Est. Poliomielita se întâlnește în continuare în Pakistan, Nigeria, India și Afghanistan.

Întrucât tot mai mulți oameni călătoresc spre și dinspre aceste țări, este posibil ca aceste boli să devină mai obișnuite. Dacă nu sunt imunizați suficient de mulți oameni, cu siguranță vor urma unele epidemii.

În cazul în care copilul dumneavoastră nu este imunizat, riscul de a contracta aceste infecții când va fi mai mare crește. Unele infecții sunt mai grave la adolescenți sau la adulți decât la copii. De exemplu, băieții aflați la vârsta adolescenței sau bărbații tineri care fac oreion pot suferi inflamații ale testiculelor, în vreme ce dacă o femeie contractează rubeolă în primele etape ale sarcinii, bebelușul poate suferi de defecte congenitale majore. Pojarul poate avea urmări mai grave la adulți.

Își fac vaccinurile întotdeauna efectul?

Vaccinurile își fac efectul în majoritatea cazurilor, dar nu întotdeauna. Majoritatea imunizărilor din perioada copilăriei protejează 90% până la 99% dintre copiii care beneficiază de acestea, dar unii copii nu reacționează la anumite vaccinuri. Iată încă un motiv important pentru ca toți copiii să fie imunizați. Protecția unui copil care nu reacționează la imunizare depinde de imunitatea altora din jurul său. Copilul dumneavoastră ar putea fi infectat de un copil care nu a fost imunizat, dar nu și de unul care este imun.

Eficiența vaccinurilor

Vaccin	Imunitatea copilului în procente după administrarea dozelor de vaccin recomandate
Vaccin BCG	Până la 80%
Vaccin antidifteric	95%
Vaccin hepatitic B	98%
Vaccin Hib	95 până la 100%
Trivaccin ROR	95%
Vaccin contra meningitei C	90%
Vaccin contra tusei convulsive	80 până la 85%
Vaccin pneumococic (PCV)	90%
Vaccin împotriva poliomielitei	99%
Vaccin antitetanos	Aproape 100%

Ce conțin vaccinurile?

Vaccinurile conțin substanțe active (vaccinul în sine) și aditivi precum conservanți și stabilizatori.

Substanțe active

Vaccinurile sunt preparate din aceleași bacterii care determină infecțiile, însă bacteriile din vaccinuri sunt fie omorâte, fie slăbite, astfel încât să nu determine îmbolnăvirea copilului dumneavoastră, fiind ca urmare sigure.

Aditivi

Vaccinurile pot conține:

- o cantitate mică de conservant pentru a proteja vaccinul împotriva contaminării
- alți aditivi pentru a asigura amestecarea uniformă a substanței active în toată combinația injectiei și
- o cantitate mică de sare de aluminiu, care ajută organismul să reacționeze mai bine la vaccin.

Nivelul de aditivi din vaccinuri este foarte scăzut și se încadrează în nivelul recomandat pe plan internațional. Acești aditivi nu cauzează niciun fel de probleme majore de sănătate în rândul bebelușilor și copiilor mici.

Vaccinurile utilizate în programul de imunizare al copiilor din Irlanda nu conțin deloc tiomersal.

Sunt sigure vaccinurile?

Vaccinurile utilizate în Irlanda sunt sigure. Toate medicamentele pot avea efecte secundare, dar în cazul vaccinurilor acestea sunt, de regulă, neglijabile, cum ar fi un braț sau un picior ușor inflamât sau o febră ușoară. Efectele secundare grave la un vaccin sunt extrem de rare.

Cercetări din lumea întreagă arată că imunizarea este cea mai sigură modalitate de a ocroti sănătatea copilului. Medicul sau asistenta dumneavoastră vă poate prezenta eventualele riscuri înainte de a-i administra copilului un vaccin.

Toate vaccinurile recomandate utilizate pentru protejarea copiilor din Irlanda sunt produse după licența Consiliului Irlandez pentru Medicamente sau a Agenției Europene pentru Medicamente. Utilizarea acestora este autorizată numai după ce se demonstrează că sunt eficiente și sigure.

De ce circula tot soiul de povestiri înspăimântătoare?

Știm că vaccinurile nu cauzează autism, diabet, scleroză difuză, alergii, astm sau sindromul deficitului de atenție (cunoscut de regulă ca hiperactivitate). Totuși, când astfel de maladii se abat asupra copiilor noștri cam în aceeași perioadă în care sunt imunizați, am putea trage concluzia greșită că există o legătură între acestea. De exemplu, simptomele de autism încep să se observe, de obicei, în jurul vârstei la care copiii sunt vaccinați cu trivaccinul ROR, dar nu acesta cauzează boala. Întrucât majoritatea copiilor sunt imunizați, cei care suferă de afecțiuni cum ar fi autismul,

astmul, sindromul deficitului de atenție au fost și ei probabil imunizați. Studiile care urmăreau să explice dacă copiii care au fost imunizați sunt mai predispuși la aceste boli au demonstrat că nu există nicio legătură între aceste afecțiuni și vaccinuri.

Ample cercetări asupra trivaccinului ROR, asupra a mii de copii, au fost efectuate în Regatul Unit, SUA, Suedia și Finlanda. Aceste cercetări au demonstrat că nu există nicio legătură între ROR și autism. În cadrul unui studiu au fost investigați toți copiii născuți în Danemarca din 1991 până în 1998. În această perioadă, 82% dintre copiii născuți în Danemarca au beneficiat de trivaccinul ROR. Cercetătorii au analizat fișele a peste o jumătate de milion de copii și au descoperit că riscul de autism la copiii imunizați era la fel de mare ca la copiii care nu fuseseră imunizați. Specialiști din lumea întreagă, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, apreciază că nu există nicio legătură între ROR și autism.

De unde pot obține o copie a calendarului de vaccinare al copilului meu?

Programul principal de imunizare al copilului este întocmit de medicul dumneavoastră de familie; el trebuie să aibă un exemplar al calendarului de vaccinare efectuate copilului dumneavoastră. Înregistrările ar putea fi puse la dispoziție și la centrul medical local. (detalii de contact sunt disponibile la adresa http://www.immunisation.ie/en/Downloads/Text_9491_en.html)

În majoritatea zonelor, programul școlar de imunizare este aplicat de echipele responsabile cu vaccinări școlare ale Oficiului Național de Imunizare (HSE), iar fișa de vaccinare va fi păstrată la centrul medical local. Într-un număr mic de zone, vaccinările școlare sunt efectuate în cadrul serviciilor medicului de familie, iar fișele le puteți găsi la medicul dumneavoastră de familie sau la centrul medical local. (detalii de contact sunt disponibile la adresa http://www.immunisation.ie/en/Downloads/Text_9491_en.html)

National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare) eliberează pașapoarte de imunizare pe care dumneavoastră sau vaccinatorul le puteți completa, astfel încât toate înregistrările pentru copilul dumneavoastră să fie păstrate la un loc. Dacă doriți să comandați o copie a acestei broșuri pentru vaccinările copilului dumneavoastră, vă rugăm să vizitați (<http://www.healthpromotion.ie/>)

Pentru informații suplimentare, vizitați www.immunisation.ie