

لقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib (المستدمية النزلية النوع B) معلومات للآباء

ما معنى Hib؟

كلمة Hib هي اختصار للأنفلونزا البكتيرية النوع B (وتسمى أيضا المستدمية النزلية النوع B). وهذا المرض عبارة عن بكتيريا يمكنها أن تسبب عدوى خطيرة للأطفال، وأيضا للأشخاص ذوي جهاز المناعة الضعيف.

كيف ينتشر مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib؟

مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib هو مرض معد. وتعيش البكتيريا المسببة له في أنف وحلق الإنسان. وينتقل المرض عبر الهواء من خلال شخص يحمل هذه البكتيريا وذلك عن طريق السعال أو العطس أو حتى التنفس.

ما هي الأمراض التي يسببها؟

من الممكن أن يتسبب مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib في أمراض خطيرة، منها:

التهاب السحايا (التهاب الغشاء الذي يحيط بالمخ)

الإنتان الدموي (تسمم الدم)

التهاب لسان المزمار (تورم في الحلق يسبب الاختناق)

التهاب العظم والنقي (عدوى العظام)

من الأكثر عرضة للإصابة؟

مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib أكثر شيوعا بين الأطفال الأقل من أربعة أعوام. ويعتبر الأطفال الأقل من عام واحد أكثر عرضة للمرض بصفة خاصة.

هل يوجد لقاح ضد مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib؟

منذ عام 1992 يتم تقديم لقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib لجميع الأطفال كجزء من برنامج تطعيمات الأطفال. الأطفال الذين سيولدون في الأول من يوليو 2008 أو بعد هذا التاريخ ينبغي أن يتلقوا لقاح 6 في 1 - الذي يحتوي على لقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib بالإضافة إلى لقاحات الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي B - في سن 2 و 4 و 6 شهور.

هل يحتاج طفلي إلى جرعة تنشيطية ضد مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib؟

بعد استعمال لقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib انخفض عدد حالات الإصابة بمرض الأنفلونزا البكتيرية Hib بشكل كبير للغاية. إلا أنه في عام 2004 تم رصد عدد قليل من الحالات المصابة بمرض الأنفلونزا البكتيرية Hib في أطفال رغم أنه تم إعطائهم اللقاح بالفعل. ولهذا فقد تم حاليا إضافة جرعة تنشيطية إلى برنامج التطعيم.

ولمزيد من الحماية ضد الإصابة بمرض الأنفلونزا البكتيرية Hib ينبغي أن يتلقى طفلك الجرعة التنشيطية في نفس الوقت مع لقاح المكورات السحائية C في سن 13 شهرا.

ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح؟

قد يصاب بعض الأطفال بالقلق أو الاحمرار أو التورم بعد حقنهم. وقد يكونون عصبيين بعض الشيء ويصابوا بارتفاع درجة الحرارة. فإذا حدث هذا يمكنك إعطاؤهم باراسيتامول أو إيبوبروفين الخاصين بالأطفال. يجب أن تجعلهم يشربون كمية كبيرة من المشروبات. احرص على ألا ترتفع درجة حرارتهم بشكل كبير، وتأكد أن ملابسهم لا تحك مكان الحقنة.

من الذي ينبغي ألا يتلقى لقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib؟

هناك قلة من الأشخاص ينبغي ألا يتم تطعيمهم بلقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib. ينبغي ألا يأخذ طفلك اللقاح إذا كانت لديه حساسية حقيقية

(العوار) ضد لقاح سابق مضاد للأنفلونزا البكتيرية Hib أو حساسية لأحد مكونات اللقاح. ينبغي أن تؤجل التطعيم إذا كان طفلك مريضاً بالحمى بدرجة حرارة تزيد على 38°م

لقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib يقي فقط من التهاب السحايا والانتان الدموي الناتجين عن مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib. ولكن هناك أنواع أخرى من الأمراض يسببها مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib، ويتعين عليك معرفة الأعراض المرتبطة بها حتى يمكنك تمييزها. ومن هذه الأعراض:

الحمى

رفض الطعام

جلد شاحب أو مبرقش، أو به بقع أو طفح جلدي

خمول أو صعوبة في الاستيقاظ

إذا ساورك القلق بخصوص حالة طفلك، فاتصل بطبيب العائلة على الفور.

للمزيد من المعلومات

اتصل بطبيب العائلة أو مرشد صحي عام

حصل على نسخة من دليل تطعيمات طفلك – دليل للأبوين من المرشد الصحي العام

تفضل بزيارة موقعي الإنترنت www.hpsc.ie أو www.immunisation.ie

الناشر: المكتب القومي للصحة والسلامة HSE

تاريخ النشر: أبريل 2008

كود الطلب: HPM00483