

Vaccinul Hib

Prospect pentru informarea părinților

Ce este Hib (Haemophilus Influenzae tip B)?

Haemophilus influenzae tip B (Hib) este o bacterie care poate provoca infecții serioase la om, în special la copii, dar și la persoane cu un sistem imunitar slăbit.

Cum se transmite Hib?

Aceasta este o bacterie contagioasă care se răspândește prin contact direct cu o persoană infectată.

Ce boli produce această bacterie?

Hib poate produce boli grave precum

- Meningită (inflamarea țesuturilor care înconjoară creierul)
- Septicemie (infecția sângelui)
- Epiglotită (inflamare a gâtului care poate cauza sufocarea)
- Osteomielită (infecție a oaselor)

Cum se transmite Hib?

Hib habitează nasul și gâtul omului. Se răspândește în aer prin tuse, strănut sau chiar prin respirație.

Ce categorii de persoane sunt cel mai expuse la Hib?

Boala Hib se întâlnește cel mai frecvent la copiii sub 4 ani, cei mai expuși riscului fiind copiii sub un an.

Există un vaccin împotriva Hib?

Începând din 1992 vaccinul Hib a fost oferit tuturor copiilor ca parte a programului obișnuit de imunizare. Vaccinul 5 în 1 (Anti-Difteric/Tetanus/Pertussis/Polio/Hib) care conține vaccinul Hib trebuie administrat tuturor bebelușilor de 2, 4 și 6 luni.

Este necesară o revaccinare Hib?

După introducerea vaccinului Hib, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu Hib a scăzut semnificativ. Totuși, în anul 2004 a apărut un număr relativ mic de cazuri de îmbolnăviri cu Hib la copii care au fost complet vaccinați.

Pentru a asigura o protecție suplimentară împotriva infecției cu Hib toți copiii care împlinesc 12 luni trebuie să primească o doză de vaccin Hib în același timp cu vaccinul MMR.

La ce trebuie să ne așteptăm după vaccinare?

După primirea vaccinului, copilul poate prezenta dureri, inflamare și roșeață în jurul zonei unde s-a administrat injecția. Pot fi irascibili și pot avea sindrom febril.

Dacă apar astfel de manifestări puteți să le dați paracetamol sau ibuprofen. Trebuie să le dați multe lichide. Asigurați-vă că nu le este prea cald și că hainele nu freacă zona injectată.

Există vreo categorie de populație care nu trebuie vaccinată cu Hib?

Există foarte puține persoane care nu trebuie să primească vaccinul Hib. Copilul dumneavoastră nu trebuie vaccinat dacă a prezentat o reacție cu adevărat alergică (reacție anafilactică) la un vaccin anterior sau orice componentă a unui vaccin.

Trebuie amânată administrarea vaccinului dacă copilul dumneavoastră este bolnav având febră mai mare de 38°C

Pentru informații suplimentare

- Contactați medicul de familie sau asistenta de sănătate publică.
- Procurați un exemplar din „Imunizările Copilului meu - un ghid pentru părinți”, care este disponibil la asistenta dumneavoastră de sănătate publică
- Vizitați www.immunisation.ie sau www.hpsc.ie

Publicat de: Biroul Național de Imunizare HSE

Data publicării: Septembrie 2007

Codul de comandă: HPM00483