

## **Вакцина против Hib-инфекции Информационная брошюра для родителей**

### **Что такое Hib (Haemophilus Influenzae типа B)?**

Haemophilus influenzae типа B (Hib) — это бактерия, которая вызывает серьезное инфекционное заболевание человека, особенно детей, а также и лиц с ослабленной иммунной системой.

### **Как распространяется Hib?**

Это безвредная бактерия, которая передается при близком контакте с носителем инфекции.

### **Какие заболевания она вызывает?**

Hib может вызвать серьезные заболевания, в том числе:

- менингит (воспаление мозговых оболочек);
- сепсис (заражение крови);
- эпиглоттит (опухоль в горле, которая вызывает удушье);
- остеомиелит (костная инфекция).

### **Как передается Hib?**

Hib обитает в носоглотке человека. Она передается воздушно-капельным путем.

### **Кто находится в зоне повышенного риска?**

Заболевания, вызываемые Hib, наиболее часто встречаются у детей до четырех лет, преимущественно у детей грудного возраста.

### **Существует ли вакцина против Hib?**

С 1992 года вакцина против Hib предлагается всем детям как часть стандартной программы вакцинации. Вакциной «5 в 1» (дифтерия/столбняк/коклюш/полиомиелит/Hib), которая содержит вакцину против Hib, следует прививать всех детей в возрасте двух, четырех и шести месяцев.

### **Необходима ли повторная вакцинация против Hib?**

После начала вакцинации против Hib число заболеваний, вызываемых этой бактерией, значительно снизилось. Однако в 2004 году было зафиксировано несколько заболеваний, вызываемых Hib, у детей, которые были полностью привиты.

Для дополнительной защиты против Hib все дети в возрасте 12 месяцев должны получить повторную вакцинацию против Hib одновременно с вакциной MMR.

### **Чего следует ожидать после прививки?**

После получения вакцины у вашего ребенка может появиться воспаление, припухлость или покраснение в месте, где была сделана инъекция. Ребенок может стать раздражительным, у него может быть лихорадка.

Если это произойдет необходимо дать ребенку парацетамол или ибупрофен. Также необходимо обильное питье. Убедитесь, что ребенок одет не слишком тепло, а одежда не натирает место инъекции.

### **Есть ли те, кого нельзя вакцинировать против Hib?**

Hib-вакцинация имеет минимальные противопоказания. Ее не должны получать те, у кого была положительная аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую вакцину или на любую составляющую вакцины.

Вам следует отложить вакцинацию, если Ваш ребенок болеет, причем температура выше 38°C

### **Для получения дальнейшей информации**

- Обратитесь к своему семейному врачу или участковой медсестре.
- Получите экземпляр брошюры «My Child's Immunisations» («Вакцины для моего ребенка») — справочник для родителей, который вы можете взять у своей участковой медсестры.
- Посетите [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) или [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

*Опубликовано: HSE National Immunisation Office*

*Дата публикации: Сентябрь 2007*

*Код заказа:HPM00483*