

Vakcína Hib

Informácie pre rodičov

Čo je Hib?

Skratka Hib označuje baktériu Haemophilus influenzae typu B. Ide o baktériu, ktorá môže spôsobiť vážnu infekciu u detí, ako aj u ľudí s oslabeným imunitným systémom.

Ako sa Hib šíri?

Hib je nákazlivé ochorenie. Baktéria žije na sliznici nosa a hrdla ľudí. Šíri sa vzduchom od osoby, ktorá je nositeľom baktérie, a to kašľaním, kýchaním, či dokonca dýchaním.

Aké ochorenia spôsobuje?

Hib môže spôsobiť vážne choroby vrátane:

- meningitídy (zápalu mozgových blán)
- sepsy (otravy krvi)
- epiglottitídy (zápalu hrtanovej príchlopky, ktorý môže viesť k uduseniu)
- osteomyelitídy (zápalu kostnej drene)

Kto je najviac ohrozený?

Choroby spôsobené Hib sa najčastejšie vyskytujú u detí do štyroch rokov. Obzvlášť ohrozené sú deti do veku jedného roka.

Existuje vakcína proti Hib?

Od roku 1992 je vakcína Hib dostupná pre všetky deti v rámci detského imunizačného programu. Deti narodené 1. júla 2008 a neskôr, by mali dostať vakcínu 6_v 1, ktorá okrem očkovacej látky proti Hib obsahuje aj očkovacie látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne a žltacke typu B - a to v druhom, štvrtom a šiestom mesiaci života.

Potrebuje moje dieťa preočkovanie proti Hib?

Po zavedení vakcíny proti Hib sa počet prípadov ochorení, spôsobených Hib, dramaticky znížil. V roku 2004 sa však vyskytlo niekoľko prípadov ochorení spôsobených Hib u detí, ktoré boli plne zaočkované. Preto je preočkovanie v súčasnosti zahrnuté do imunizačného programu.

Na zabezpečenie zvýšenej obrany proti Hib by vaše dieťa malo byť preočkované v rovnakom čase, ako je preočkované vakcínou Men C, teda v 13. mesiaci života.

Čo možno očakávať po podaní vakcíny

U niektorých detí sa môže prejaviť mierna bolesť, začervenanie alebo opuch v mieste vakcinácie. Môžu byť podráždené alebo mať zvýšenú teplotu. V takých prípadoch im môžete podať detský paracetamol alebo ibuprofen. Takisto je potrebné zabezpečiť zvýšený prísun tekutín. Je dôležité, aby sa deti neprehrievali a aby ich odev nedráždil miesto vakcinácie.

Kto by sa vakcínou Hib nemal očkovať?

Je len veľmi málo ľudí, u ktorých sa očkovanie vakcínou Hib neodporúča. Vaše dieťa by vakcínou nemalo byť zaočkované, ak sa u neho prejavila pravá alergická reakcia (anafylaktický šok) na predchádzajúce očkovanie vakcínou Hib alebo na niektorú jej zložku.

Očkovanie by ste mali odložiť, ak je vaše dieťa choré a s teplotou vyššou ako 38 °C

Vakcína Hib chráni len pred zápalom mozgových blán a sepsou, spôsobených v dôsledku ochorenia Hib. Existujú aj iné typy týchto chorôb, preto by ste mali poznať symptómy, ktoré treba hľadať. Medzi ne môže patriť:

- Zvýšená teplota
- Odmietanie potravy
- Bledá alebo ťakatá pokožka, škvrny alebo vyrážka
- Ospanlivosť alebo ťažkosti s prebúdzaním

Ak máte o svoje dieťa strach, okamžite kontaktujte svojho rodinného (praktického) lekára.

Ak potrebujete viac informácií

- o Kontaktujte svojho praktického lekára alebo všeobecnú zdravotnú sestru
- o Zaoštarajte si výtlačok príručky **Imunizácia vášho dieťaťa – Príručka pre rodičov** u svojej všeobecnej zdravotnej sestry
- o Navštívte stránky www.immunisation.ie alebo www.hpsc.ie