

肺炎链球菌疫苗

告家长书

什么是肺炎链球菌疾病？

肺炎链球菌疾病是一种由肺炎链球菌导致的感染性疾病。

肺炎链球菌疾病是如何传播的？

肺炎链球菌疾病具有传染性。这种细菌滋生在人的鼻部和喉部。该疾病是通过携带这种细菌的人咳嗽、打喷嚏或甚至通过呼吸借空气传播。

它会导致哪些疾病？


肺炎链球菌疾病可导致严重的疾病，包括：

- 脑膜炎（脑膜发炎）
- 败血病（血液中毒）
- 肺炎

哪些人最易受感染？

肺炎链球菌疾病在两岁以下的儿童和65岁以上的老人中最为常见（参见图表）。

2006年不同年龄组的肺炎链球菌疾病发病率（来源：HPSC）



有针对肺炎链球菌疾病的疫苗吗？

自从2002年以来，已经为爱尔兰境内患有特殊疾病的儿童接种了肺炎链球菌疫苗（简称PCV）。对于在2008年7月1日或之后出生的婴儿，将在他们2个月月龄和6个月月龄接种其他疫苗时同时接种PCV。

同时接种一种以上的疫苗安全吗？

是的，这是安全的。为您的婴儿定期接种疫苗，为他们提供最好的保护。

我的孩子需要接种PCV加强疫苗吗？

为了更好地保护儿童免受肺炎链球菌感染，在其12个月月龄接种MMR疫苗时同时接种PCV加强疫苗。

接种疫苗后会出现什么情况？

有些儿童会感觉注射部位不舒服、发红或肿胀。

他们可能会出现心情烦躁和体温升高的症状。

如果出现这些情况，您可以给他们服用儿童装扑热息痛或布洛芬。

同时您需要给他们喝大量的水。

请确保不要让孩子穿得过热，并且不要让衣物摩擦到注射区域。

哪些人不能接种PCV？

几乎人人都能接种PCV。如果您的孩子对先前的剂量或疫苗的任何部分有过敏性反应，那么您的孩子将不能接种这种疫苗。

PCV只能抵抗导致肺炎链球菌脑膜炎和败血病的最为常见肺炎链球菌菌株。这种疾病还有其他很多类型，因此您需要了解需要密切注意的症状。这些症状包括：

- 发烧
- 厌食
- 皮肤苍白或有水泡、斑点或皮疹
- 困倦或睡不醒。

如果您对孩子的情况很担心，请立即联系您的家庭医生。

更多信息

- 请与您的家庭医生或社区护士联系
- 从您的社区护士处索取您孩子的免疫法 – 家长指南 副本
- 访问www.immunisation.ie或www.hpsc.ie

出版：HSE国家疫苗接种办公室

出版日期：2008年4月

订购编号：HNI00512