

## Szczepionka przeciwko pneumokokom

### Informacje dla rodziców

#### Czym są pneumokoki?

Choroba pneumokokowa to infekcja wywołana przez bakterie streptococcus pneumoniae.

#### W jaki sposób rozprzestrzeniają się pneumokoki?

Choroba pneumokokowa to choroba zakaźna. Bakterie żyją w jamie nosowej oraz w gardle człowieka. Rozprzestrzeniają przez powietrze, gdy nosiciel kaszle, kicha a nawet w trakcie oddychania.

#### Jakie choroby wywołują te bakterie?


Pneumokoki powodują poważne choroby, w tym:

- Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- Posocznicę
- Zapalenie płuc

#### Kto jest najbardziej narażony na zakażenie?

Najbardziej narażone na pneumokoki są dzieci poniżej drugiego roku życia oraz osoby powyżej 65. roku życia (patrz wykres).

Statystyka zachorowań na pneumokoki według grup wiekowych w 2006 roku (źródło: HPSC)



### **Czy istnieje szczepionka przeciwko pneumokokom?**

Szczepionka przeciwko pneumokokom (PCV) jest podawana dzieciom w Irlandii w specjalnych warunkach od 2002 roku. Niemowlęta urodzone 1. lipca lub po 1. lipca 2008 roku otrzymają szczepionkę PCV w 2. i 6. miesiącu życia w tym samym czasie co inne szczepionki.

### **Czy bezpieczne jest podanie kilku szczepionek w tym samym czasie?**

Tak, jest to bezpieczne. Program szczepień został tak opracowany, aby zapewnić najlepszą ochronę dla dzieci.

### **Czy dziecko potrzebuje dawki wzmacniającej szczepionkę PCV?**

Aby zwiększyć dodatkowo ochronę przeciwko zapaleniom pneumokokowym, dziecko powinno otrzymać dawkę wzmacniającą PCV w tym samym czasie co szczepienie MMR w 12 miesiącu życia.

### **Czego oczekiwać po szczepieniu?**

Niektóre dzieci mogą odczuwać lekki ból, swędzenie lub może pojawić się zaczerwienienie w miejscu wykonania zastrzyku. Dziecko może być rozdrażnione lub gorączkować. Wtedy należy podać dziecku paracetamol lub ibuprofen dla dzieci. Powinno ono również dużo pić. Należy upewnić się, że dziecku nie jest zbyt gorąco oraz że ubrania nie ocierają o miejsce, w które wstrzyknięto szczepionkę.

### **Komu nie należy podawać szczepionki PCV?**

Bardzo niewiele jest osób, którym nie należy podawać szczepionki PCV. Nie należy jej podawać dzieciom, które wykazały reakcje alergiczne (anafilaksja) na wcześniejsze dawki szczepionki lub któryś ze składników szczepionki.

Szczepionka PCV chroni jedynie przed najczęściej występującymi odmianami bakterii streptococcus pneumoniae, które wywołują pneumokokowe zapalenie opon oraz posocznice. Te bakterie wywołują również inne choroby, dlatego też należy znać ich objawy, aby obserwować dziecko. Choroby mogą objawiać się:

- Gorączką
- Brakiem apetytu
- Błędą lub pokrytą plamami skórą, krostkami lub wysypką
- Sennością lub trudnościami w poruszaniu się

Jeżeli dziecko ma niepokojące objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

#### **Dodatkowe informacje**

- Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką środowiskową
- Należy poprosić o kopię przewodnika dla rodziców **Your child's immunisations – A guide for parents** pielęgniarkę środowiskową
- Należy wejść na stronę [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) lub [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

Wydano: HSE National Immunisation Office

Data wydania: Kwiecień 2008

Kod zamówienia: HNI00512