

Vacina antipneumocócica

Informações para os pais

O que é a doença pneumocócica?

A doença pneumocócica é uma infecção causada pela bactéria streptococcus pneumoniae.

Como é que a doença pneumocócica se transmite?

A doença pneumocócica é contagiosa. A bactéria habita no nariz e na garganta dos humanos. A doença transmite-se através do ar por uma pessoa que transporta a bactéria ao tossir, espirrar ou mesmo respirar.

Quais são os distúrbios que provoca?


A doença pneumocócica pode causar distúrbios sérios incluindo:

- Meningite (inflamação das membranas que envolvem o cérebro)
- Septicemia (envenenamento do sangue)
- Pneumonia

Quem é que corre mais riscos?

A doença pneumocócica é mais comum em crianças com menos de dois anos e pessoas com mais de 65 anos (consulte o gráfico).

Taxas da doença pneumocócica por faixa etária, 2006 (fonte: HPSC)



Existe alguma vacina contra a doença pneumocócica?

A vacina antipneumocócica (PCV) tem sido administrada, na Irlanda, a crianças em condições médicas especiais, desde 2002. Bebés nascidos em ou após 1 de Julho de 2008 irão receber a PCV aos 2 e 6 meses de idade em simultâneo com as outras vacinas.

É seguro tomar mais do que uma vacina ao mesmo tempo?

Sim, é seguro. As vacinas estão previstas para fornecer ao seu bebé a melhor protecção.

O meu filho necessita de um reforço da PCV?

Para ter uma protecção extra contra a infecção pneumocócica, o seu filho deve receber o reforço PCV ao mesmo tempo que tomar a vacina MMR aos 12 meses de idade.

O que acontece após a vacina?

Algumas crianças podem sentir desconforto, vermelhidão ou inchaço na zona onde foi administrada a injeção. Poderão ficar irritáveis e a temperatura subir. Se tal acontecer, poderá administrar-lhes paracetamol ou ibuprofeno infantil. Deverá dar-lhe também bastantes líquidos. Certifique-se de que não estão demasiado quentes e que as suas roupas não estão a friccionar a zona da injeção.

Quem não deve tomar a PCV?

São poucas as pessoas que não devem tomar a PCV. O seu filho não deve ser vacinado se tiver tido uma verdadeira reacção alérgica (anafilaxia) a uma dose anterior ou a qualquer parte de uma vacina.

A PCV protege apenas contra a estirpe mais comum do streptococcus pneumoniae causador da meningite pneumocócica e da septicemia. Existem outros tipos de doenças, pelo que terá de conhecer os sintomas para as reconhecer. As mesmas podem incluir:

- Febre
- Recusar comida
- Pela pálida ou manchada, borbulhas ou uma erupção cutânea
- Moleza ou dificuldades em andar

No caso de estar preocupado com o seu bebé, contacte imediatamente o seu médico de família.

Para obter mais informações

- Contacte o seu médico de família ou a enfermeira da saúde pública
- Peça a sua cópia do **A vacinação do seu filho – Um guia para pais** que pode obter junto da enfermeira da saúde pública
- Visite as páginas www.immunisation.ie ou www.hpsc.ie

Publicado pelo: HSE National Immunisation Office

Data de Publicação: Abril de 2008

Código de encomenda: HNI00512