

Vaccinul antipneumococic

Informații pentru părinți

Ce este boala pneumococică?

Boala pneumococică este o infecție determinată de bacteria streptococcus pneumoniae.

Cum se transmite boala pneumococică?

Boala pneumococică este contagioasă. Bacteria se găsește în nasul și gâtul oamenilor. Boala se transmite prin aer de către o persoană purtătoare a bacteriei - prin tuse, strănut sau chiar respirație.

Ce boli produce această bacterie?


Boala pneumococică poate produce boli severe care includ:

- Meningită (inflamarea țesuturilor care înconjoară creierul)
- Septicemie (infecția sângelui)
- Pneumonie

Care sunt persoanele cele mai expuse la risc?

Boala pneumococică este mai frecventă la copiii sub 2 ani și la persoanele peste 65 de ani (vezi diagrama).

Incidența bolii pneumococice în funcție de vârstă în 2006 (sursa: HPSC)



Există un vaccin împotriva bolii pneumococice?

Vaccinul antipneumococic (PCV) a fost administrat copiilor cu afecțiuni medicale speciale în Irlanda din anul 2002. Copiii născuți pe sau după 1 iulie 2008 vor primi PCV la vârsta de 2 și 6 luni în același timp cu celelalte vaccinuri.

Este sigur să fie administrat mai mult de un vaccin în același timp?

Da, este sigur. Vaccinurile sunt programate să îi asigure copilului dumneavoastră cea mai bună protecție.

Copilul meu are nevoie de un vaccin PCV?

Pentru a asigura o protecție suplimentară împotriva infecției cu Pneumococ, copilul dumneavoastră trebuie să primească o doză de vaccin PCV în același timp cu vaccinul MMR la vârsta de 12 luni.

La ce vă puteți aștepta după vaccinare

Unii copii pot avea la locul injecției o zonă dureroasă, roșie sau inflamată. Pot fi irascibili și pot avea sindrom febril. Dacă apar astfel de manifestări puteți să le dați paracetamol sau ibuprofen pentru copii. Trebuie să le dați să bea multe lichide. Asigurați-vă că nu le este prea cald și că hainele nu se freacă de zona injectată.

Cui nu trebuie să i se administreze PCV?

Există foarte puține persoane cărora nu trebuie să li se administreze PCV. Copilului dumneavoastră nu trebuie să i se administreze vaccinul dacă a avut o reacție alergică adevărată (anafilactică) la o doză anterioară sau la orice particulă din vaccin.

PCV protejează doar împotriva celor mai obișnuite tulpini de streptococcus pneumoniae care cauzează septicemia și meningita pneumococică. Există și alte tipuri de astfel de boli, astfel că trebuie să știți ce simptome să căutați. Acestea pot include:

- Febră
- Refuzul hranei
- Tegument palid, cu pete sau iritații
- Amețeli sau dificultăți la trezire.

Dacă vă îngrijorează starea copilului dumneavoastră, contactați-l imediat pe medicul dumneavoastră de familie.

Pentru mai multe informații

- Contactați-l pe medicul dumneavoastră de familie sau pe asistenta de sănătate publică
- Procurați un exemplar din **Imunizările copilului dumneavoastră – Un ghid pentru părinți** disponibil la asistenta dumneavoastră de sănătate publică
- Vizitați www.immunisation.ie sau www.hpsc.ie

Publicat de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Aprilie 2008

Codul de comandă: HNI00512