

Пневмококковая вакцина

Информация для родителей

Что такое пневмококковая инфекция?

Пневмококковая инфекция — это инфекция, вызываемая бактериями *Streptococcus pneumoniae*.

Как распространяется пневмококковая инфекция?

Пневмококковая инфекция является заразной. Бактерии обитают в носоглотке человека. Заболевание передается воздушно-капельным путём, когда носитель бактерии кашляет, чихает или даже дышит.

Какие заболевания она вызывает?


Пневмококковая инфекция может вызвать серьёзные заболевания, в том числе:

- менингит (воспаление мозговых оболочек);
- сепсис (заражение крови);
- пневмония.

Кто находится в зоне повышенного риска?

Пневмококковая инфекция чаще всего встречается среди детей до двух лет и взрослых старше 65 лет (см. график).

Показатели заболеваемости пневмококковой инфекцией по возрастным группам в 2006 г. (источник: HPSC)



Существует ли вакцина против пневмококковой инфекции?

Пневмококковой вакциной (PCV) дети с особыми медицинскими показаниями прививаются в Ирландии с 2002 г. Дети, родившиеся 1 июля 2008 г. и позже, будут привиты PCV вместе с другими вакцинами в возрасте 2 и 6 месяцев.

Безопасно ли совмещение нескольких вакцин?

Да, это безопасно. Вакцины синхронизированы таким образом, чтобы обеспечить наилучшую защиту для вашего ребёнка.

Нужна ли моему ребёнку повторная вакцинация PCV?

Для дополнительной защиты против пневмококковой инфекции ваш ребёнок должен пройти повторную вакцинацию PCV одновременно с вакциной MMR в возрасте 12 месяцев.

Чего следует ожидать после вакцинации

Некоторые дети могут чувствовать дискомфорт, в месте инъекции у них могут возникнуть покраснение или отёчность. Ребёнок может стать раздражительным, у него может быть повышенная температура. Если это произойдет, необходимо дать ребёнку детский парацетамол или ибупрофен. Также необходимо обильное питьё. Убедитесь, что ребёнок одет не слишком тепло, а одежда не натирает место инъекции.

Кого нельзя вакцинировать PCV?

PCV имеет минимальные противопоказания. Ваш ребёнок не должен её получать, если у него была положительная аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую вакцину или на любую составляющую вакцины.

PCV защищает только от обычного *Streptococcus pneumoniae*, который вызывает пневмококковый менингит и сепсис. Существуют другие типы этих заболеваний, поэтому необходимо различать характерные симптомы. Это может быть:

- лихорадка
- отказ от еды
- бледность или неравномерный цвет кожных покровов, пятна или сыпь
- сонливость или трудное пробуждение

Если ваш ребёнок вызывает у вас беспокойство, немедленно свяжитесь с вашим врачом.

Дополнительная информация

- Обратитесь к своему семейному врачу или участковой медсестре
- Получите экземпляр брошюры «**Your child's immunisations – A guide for parents**» (Вакцины для вашего ребёнка — справочник для родителей) у своей участковой медсестры
- Посетите сайты www.immunisation.ie или www.hpsc.ie

Опубликовано: HSE National Immunisation Office

Дата публикации: апрель 2008 г.

Код заказа: HNI00512