

Pneumokoková vakcína

Informácie pre rodičov

Čo sú pneumokokové choroby?

Pneumokokové choroby sú infekčné ochorenia, spôsobené baktériou *Streptococcus pneumoniae*.

Ako sa pneumokoková infekcia šíri?

Pneumokoková infekcia je nákazlivá. Baktéria žije na sliznici nosa a hrdla ľudí. Šíri sa vzduchom od osoby, ktorá je nositeľom baktérie, a to kašľaním, kýchaním, či dokonca dýchaním.

Aké ochorenia spôsobuje?


Pneumokoková infekcia môže viesť k vážnym ochoreniam vrátane:

- meningitídy (zápalu mozgových blán)
- sepsy (otravy krvi)
- zápalu pľúc

Kto je najviac ohrozený?

Pneumokokové infekcie sa najčastejšie vyskytujú u detí do dvoch rokov a u ľudí starších ako 65 rokov (pozri diagram)..

Miera pneumokokových chorôb podľa vekových skupín 2006 (zdroj: HPSC)



Existuje vakcína proti pneumokokovej infekcii?

Pneumokoková vakcína (PCV) sa v Írsku podáva deťom so zhoršeným zdravotným stavom od roku 2002. Deti narodené 1. júla 2008 a neskôr, by sa mali vakcínou PVC zaočkovať v rovnakom čase, ako dostávajú ostatné očkovania, vo veku dvoch a šiestich mesiacov.

Je bezpečné dostať viac ako jednu očkovaciu látku naraz?

Áno, je to bezpečné. Očkovanie je načasované tak, aby vášmu dieťaťu zabezpečilo čo najlepšiu ochranu.

Potrebuje moje dieťa preočkovanie vakcínou PVC?

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany vášho dieťaťa proti pneumokokovej infekcii by malo byť preočkované v rovnakom čase, ako je preočkované vakcínou MMR, v 12. mesiaci života.

Čo možno očakávať po podaní vakcíny

U niektorých detí sa môže prejavíť mierna bolesť, začervenanie alebo opuch v mieste vakcinácie. Môžu byť podráždené alebo mať zvýšenú teplotu. V takých prípadoch im môžete podať detský paracetamol alebo ibuprofen. Takisto je potrebné zabezpečiť zvýšený prísun tekutín. Uistite sa, že sa deti neprehrievajú a ich odev nedráždi miesto vpichu vakcíny.

Kto by sa nemal očkovať vakcínou PCV?

Je len veľmi málo ľudí, u ktorých sa očkovanie PCV neodporúča. Vaše dieťa by vakcínou nemalo byť zaočkované, ak sa u neho prejavila pravá alergická reakcia (anafylaktický šok) na predchádzajúce očkovanie vakcínou PCV alebo na niektorú jej zložku.

PCV chráni len pred najbežnejšie rozšírenými kmeňmi baktérie *Streptococcus pneumoniae*, ktoré spôsobujú pneumokokovú meningitídu a sepsu. Existujú aj iné typy týchto chorôb, preto by ste mali poznať symptómy, ktoré treba hľadať. Medzi ne môže patriť:

- Zvýšená teplota
- Odmietanie potravy
- Bledá alebo fľakatá pokožka, škrvy alebo vyrážka
- Ospalivosť alebo ťažkosti s prebúdzaním.

Ak máte o svojom dieťu strach, okamžite kontaktujte svojho praktického lekára.

Ak potrebujete viac informácií

- Kontaktujte svojho praktického lekára alebo všeobecnú zdravotnú sestru
- Zaobstarajte si výtlačok príručky **Imunizácia vášho dieťaťa – Príručka pre rodičov** u svojej všeobecnej zdravotnej sestry
- Navštívte stránky www.immunisation.ie alebo www.hpsc.ie