Vacinas 4 em 1 & MMR

Informação para pais de crianças na **P**ré-primária

A vacina **4 em 1**

Como se chama a vacina 4 em 1?

A vacina 4 em 1 tem o nome de IPV Boostrix.

O que é a vacina 4 em 1?

4 em 1 é o nome dado à vacina que protege contra a difteria, poliomielite, tétano e tosse convulsa. Todas estas infeções são doenças graves que podem levar a internamento hospitalar e, nos piores casos, à morte.

	Sintomas comuns	**Possíveis complicações**
Tétano	Espasmos musculares dolorosos	Convulsões (Ataques) Trismo Morte
Difteria	Dores de garganta Aceleração da frequência cardíaca	Dificuldades respiratórias Paralisia Falha cardíaca Morte
Tosse convulsa	Tosse irritante, que se assemelha a inspiração profunda e acompanhada por um som agudo desagradável ou "guincho" típico	Dificuldades respiratórias Falha cardíaca e pulmonar Morte
Poliomielite	Febre Dores de cabeça Vómitos	Paralisia Morte

Quem é que necessita da vacina 4 em 1?

O seu filho deverá ter sido imunizado contra estas doenças aos dois, quatro e seis meses de idade, como parte da vacina 6 em 1.

De forma a reforçar o sistema imunitário do seu filho e fornecer proteção adicional contra estas doenças, é necessária uma dose adicional nas crianças de 4-5 anos.

Existem crianças que não devem tomar a vacina 4 em 1?

Muito poucas crianças não devem tomar a vacina 4 em 1. O seu filho não deve tomar a vacina se tiver tido uma reação alérgica grave (anafilaxia) a uma vacina ou qualquer parte de uma vacina anterior ou tiver tido uma reação alérgica grave aos antibióticos polimixina ou neomicina.

Deverá adiar a administração da vacina 4 em 1 se o seu filho:

• estiver doente com febre alta.

A vacina 4 em 1 tem efeitos secundários?

A maioria das crianças não tem qualquer problema após a administração desta vacina.

O efeito secundário mais frequente é dor, vermelhidão ou inchaço no braço. O inchaço raramente abrange todo o braço, do ombro ao cotovelo. Por norma, isto ocorre no espaço de 2 dias após a vacinação e melhora em 4-5 dias. Não são necessários antibióticos para o tratamento desta reação local. Pode administrar paracetamol ou ibuprofeno. A criança deve também ingerir bastantes líquidos. Assegure-se que o seu filho não está demasiado quente e que a roupa não fricciona a zona da injeção.

Com menos frequência, as crianças podem ter febre, dor de cabeça ou sentirem-se adoentadas.

A Vacina MMR

Como se chama a vacina MMR?

Existem 2 vacinas MMR (diferentes no programa escolar. Têm o nome de MMRVaxPro e Priorix.

O que é a vacina MMR?

A vacina MMR protege o seu filho do sarampo, da papeira e da rubéola.

O sarampo, a papeira e a rubéola são doenças virais altamente contagiosas. São transmitidas quando o vírus passa de alguém que tem a doença para alguém que não tem nenhuma proteção contra a mesma.

	Sintomas comuns	**Possíveis complicações**
Sarampo	Febre Erupção cutânea Olhos vermelhos e dolorosos	Infeções no ouvido Pneumonia Bronquite
Papeira	Glândulas abaixo do maxilar inchadas e dolorosas e febre	Meningite Surdez Testículos dolorosos e inchados em homens adultos
Rubéola (Sarampo alemão)	Febre e erupção cutânea	Se uma mulher grávida for contagiada com rubéola, o bebé pode vir a sofrer de graves deficiências à nascença, incluindo cegueira, danos cerebrais, surdez, problemas cardíacos e outras complicações graves

Quem necessita da vacina MMR?

O seu filho deve tomar uma vacina MMR aos 12 meses de idade. As crianças devem tomar uma segunda dose na Pré-primária aos 4-5 anos de idade. Duas doses da vacina MMR irão dar ao seu filho a melhor proteção.

Se o seu filho nunca tiver tomado a vacina MMR, deverá tomar uma segunda dose 1 mês depois da primeira dose.

Existem crianças que não deverão tomar a vacina MMR?

São muito poucas as crianças que não podem tomar a vacina MMR. O seu filho não deve tomar a vacina se tiver tido uma reação alérgica grave (anafilaxia) a uma vacina MMR, qualquer parte de uma vacina anterior ou à neomicina ou gelatina, contidas na vacina MMR.

Deverá adiar a administração da vacina MMR se o seu filho:

- estiver doente com febre alta
- estiver a tomar uma dose elevada de corticosteroides
- estiver em tratamentos, tais como quimioterapia e radioterapia
- tiver qualquer condição ou doença que afete o seu sistema imunitário.

Existe alguma relação entre a vacina MMR e o autismo?

Não. Estudos demonstraram que não existe qualquer ligação entre a vacina MMR e o autismo.

A vacina MMR tem efeitos secundários?

A maioria das crianças não tem qualquer problema após a administração desta vacina. Os efeitos secundários são muito menos frequentes após a segunda dose da vacina MMR.

Algumas crianças podem ficar com dor, inchaço e vermelhidão na zona onde foi administrada a injeção. Raramente, algumas crianças podem desenvolver “minisarampo”, com erupção cutânea e febre, 6 a 10 dias mais tarde. As crianças podem desenvolver “minipapeira”, com inchaço na área do maxilar, na terceira semana após a vacinação. Estas situações não são contagiosas.

O seu filho tem de ser protegido destas
7 doenças contagiosas quando iniciam a vida escolar.

As vacinas 4 em 1 e MMR são dadas no mesmo dia e o seu filho receberá uma vacina em cada braço.

Em bebé, o seu filho já foi vacinado contra a difteria, poliomielite, tétano, tosse convulsa, sarampo, papeira e rubéola. A imunidade a estas doenças diminui ao longo do tempo, pelo que se recomenda um reforço da vacinação agora, proporcionando uma proteção adicional. O sistema imunitário do seu filho suporta facilmente estas vacinas. Estas vacinas são dadas em conjunto, fornecendo ao seu filho a melhor proteção contra estas doenças.

Como pode obter estas vacinas para o seu filho?

Estas vacinas são oferecidas como parte do programa de vacinação escolar da HSE. Receberá informações e um formulário de consentimento antes de o seu filho ser vacinado.

Nos municípios de Donegal, Sligo e Leitrim, estas vacinas são dadas pelo seu médico de família. Nestes casos, receberá uma carta do HSE a solicitar-lhe que consulte o seu médico de família quando as vacinas tiverem de ser administradas.

O que acontece se o seu filho faltar ao dia de vacinação na escola?

Ainda assim, o seu filho pode receber as vacinas. O HSE agendará uma visita a uma clínica HSE para que o seu filho seja vacinado ou ser-lhe-á solicitado que efetue uma consulta ao seu médico de família para proceder à vacinação.

O que acontece se o seu filho precisar de uma segunda dose da vacina MMR?

O HSE tomará medidas para que o seu filho seja imunizado.

Mais informações

Se tiver qualquer tipo de questão ou dúvidas, discuta-as com um membro da sua equipa de vacinação escolar do HSE, com o enfermeiro de saúde pública ou o seu médico de família.

Visite o nosso website www.immunisation.ie para saber mais sobre estas doenças infeciosas e as vacinas.

Visite www.hpra.ie ou digitalize os códigos QR para ler a informação licenciada sobre as vacinas.

@hseimm
#vaccineswork