

Înainte de imunizare

În Irlanda, toate imunizările recomandate, menționate în programul de vaccinare împotriva bolilor din prima parte a copilăriei, sunt gratuite.

NU UITAȚI că trebuie să duceți copilul de CINCI ori la medicul de familie pentru a finaliza schema de vaccinare și pentru a fi protejat complet de boli grave.

Înainte de imunizare

Înainte de imunizarea copilului, medicul sau asistenta vă va întreba dacă starea copilului este bună și dacă i se pot administra vaccinurile. Dacă aveți întrebări sau temeri cu privire la imunizarea copilului dumneavoastră, adresați-i-le medicului sau asistentei înainte de imunizare. Puteți solicita mai multe informații și de la asistenta de sănătate publică de la clinica locală HSE (Oficiul Național de Imunizare).

Pentru a beneficia gratuit de imunizare împotriva bolilor copilăriei, nu este necesar un card de sănătate sau un card de vizită medicală pe numele copilului dumneavoastră. Toți copiii din Irlanda pot beneficia gratuit de imunizări.

Există foarte puține situații în care nu se recomandă vaccinarea unui copil. Dacă aveți vreo nelămurire, discutați cu medicul sau cu asistenta înainte de a se efectua imunizarea copilului dumneavoastră.

Trebuie să-i dau copilului ceva înainte?

Puteți să-i dați copilului o băutură pe bază de zahăr cu câteva minute înainte de vaccinare. S-a demonstrat că acest lucru contribuie la reducerea durerii la locul injectării.

Nu-i administrați copilului niciun fel de calmante înainte de vaccinuri, întrucât s-a demonstrat că acest lucru reduce eficiența unor vaccinuri. Aceste medicamente trebuie utilizate numai în cazul în care copilul face febră mare (peste 39,5°C) după vaccinare.

Există anumite situații în care s-ar recomanda amânarea imunizării?

Există foarte puține motive medicale pentru amânarea imunizării. În cazul în care copilul are temperatură ridicată, imunizarea trebuie amânată până ce starea copilului se îmbunătățește. Totuși, bebelușii și copiii care prezintă o tuse ușoară sau o răceală minoră ori cei cărora li se administrează antibiotice pot fi imunizați în siguranță și cu eficiență.

În cazul în care vă întrebați dacă copilul dumneavoastră poate fi imunizat, discutați cu medicul sau cu asistenta înainte de a amâna imunizarea.

Cum stau lucrurile în cazul în care copilul meu s-a născut prematur, a avut o greutate mică la naștere sau a făcut icter?

Este important ca bebelușii născuți prematur să fie protejați deoarece sunt mai vulnerabili la anumite infecții. În general, bebelușii născuți prematur trebuie imunizați normal. În cazul în care copilul dumneavoastră a avut o greutate foarte mică la naștere, trebuie să discutați despre necesitățile sale de imunizare cu pediatriul dumneavoastră. Copiii care au avut icter după ce s-au născut și care sunt alăptați trebuie imunizați normal.

Dar dacă copilul meu are o boală gravă?

Este foarte importantă imunizarea copiilor cu boli grave deoarece pericolul de a suferi complicații în urma infecțiilor este mai mare în cazul acestora.

Copiii cu afecțiuni neurologice stabile, de exemplu paralizie cerebrală sau sindromul Down, trebuie imunizați normal.

Cu toate acestea, se recomandă prudență dacă boala sau tratamentul aferent ar putea reduce imunitatea copilului. Imunizarea trebuie evaluată cu atenție în cazul copiilor cu cancer sau cu o imunodeficiență ori în cazul celor cărora li se administrează medicamente care ar putea reduce capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor. Discutați despre acest lucru cu medicul dumneavoastră.

Copiii cărora li s-a efectuat o transfuzie sanguină sau cărora li s-au administrat produse pe bază de sânge nu trebuie vaccinați cu trivaccinul ROR decât după trei luni de la transfuzie.

Cum stau lucrurile în cazul în care copilul meu are astm, eczemă sau rinită alergică?

Copiii cu astm, eczemă, rinită alergică și alergii trebuie imunizați, chiar dacă dezvoltă o alergie severă la ouă (de exemplu, urticarie (umflături roșii care produc prurit), inflamarea gurii sau a gâtului, dificultate în respirație, respirație șuierătoare, tensiune arterială mică și șoc anafilactic).

Copiii cărora li se administrează steroizi inhalatori sau o cremă cu concentrație mică de steroizi trebuie imunizați normal. Dacă aveți îndoieli, discutați cu medicul sau cu asistenta care efectuează imunizarea.

Pot să-i fac copilului meu trivaccinul ROR și alte vaccinuri dacă este alergic la ouă?

În trecut se credea că trivaccinul ROR nu este recomandat pentru copiii alergici la ouă. Trivaccinul ROR poate fi administrat copiilor care sunt alergici la ouă. Simplu fapt că copilului nu-i plac ouăle sau faptul că face diaree ori are dureri abdominale după ce mănâncă ouă nu reprezintă motive pentru a evita imunizarea ROR; în acest caz, nu se impun măsuri de precauție speciale. Dacă aveți îndoieli, discutați cu medicul sau cu asistenta care efectuează imunizarea.

Vaccinul antigripal nu trebuie administrat celor care au o alergie severă la ouă.

Cum stau lucrurile în cazul în care copilul meu are epilepsie sau a avut convulsii (febrile)?

Acești copii trebuie totuși imunizați dacă starea lor este stabilă.

Unii copii fac crize (convulsii febrile) dacă au temperatură mare sau febră. Dacă fac febră mare (peste 39,5°C) după ce au fost vaccinați, administrați-le paracetamol sau ibuprofen.

Copiii care au în familie persoane ce suferă de epilepsie sau convulsii trebuie imunizați normal.

Cum să procedez în cazul în care copilul meu a fost operat recent sau urmează să fie operat?

Nu amânați imunizarea copilului dacă acesta urmează să fie operat sau dacă a fost operat recent. O intervenție chirurgicală nu este un motiv întemeiat pentru amânarea imunizării, iar imunizarea recentă nu este un motiv întemeiat pentru amânarea intervenției chirurgicale.

Cum stau lucrurile în cazul în care copilul meu a avut deja una dintre aceste boli?

Trebuie totuși să imunizați copilul împotriva acestor boli, chiar dacă le-a avut. Este important să fie protejat împotriva tuturor bolilor acoperite de vaccin, chiar dacă copilul a contractat deja una dintre aceste boli.

Acest lucru este foarte important întrucât copiii mai mici de 2 ani nu au suficientă imunitate naturală după ce se îmbolnăvesc de Hib, meningită C sau boală pneumococică și, ca atare, trebuie imunizați.

Poate fi imunizat copilul meu dacă intră mereu în contact cu o femeie însărcinată?

Da. Nu este nicio problemă dacă i se administrează imunizările de rutină unui copil care vine mereu în contact cu o femeie însărcinată. De fapt, imunizarea copilului va proteja mama împotriva expunerii la boli precum rubeola.

Sunt necesare și alte vaccinuri în cazul unor copii?

Da. Copiilor cărora li s-a scos splina sau cei care suferă de fibroză chistică, o imunodeficiență, o afecțiune cronică la inimă, plămâni, ficat sau rinichi, anemie cu celule în seceră sau afecțiuni precum diabetul sunt mai vulnerabili la anumite infecții. În cazul în care copilul dumneavoastră suferă de o boală persistentă, întrebați medicul dacă se recomandă imunizarea copilului împotriva unor boli precum gripa sau hepatita A.

Dacă mergeți peste hotare, nu uitați să vă interesați dacă copilului trebuie să-i fie administrat vreun vaccin special.

Imunizarea împotriva bolilor infecțioase a salvat mai multe vieți decât orice altă intervenție în domeniul sănătății publice exceptând asigurarea de apă potabilă.

Pentru informații suplimentare, vizitați www.immunisation.ie