

График иммунизации детей в первые месяцы жизни

Малыши, родившиеся после 1 октября 2016 г.



Возраст

Вакцинация

2
месяца

Визит 1 6 в 1+PCV+MenB+Rotavirus
3 инъекции + пероральные капли

4
месяца

Визит 2 6 в 1+MenB+Rotavirus
2 инъекции + пероральные капли

6
месяцев

Визит 3 6 в 1+PCV+MenC
3 инъекции

Детям в возрасте 8 месяцев 0 дней и старше вакцина против ротавирусной инфекции не вводится

12
месяцев

Визит 4 MMR + MenB
2 инъекции

13
месяцев

Визит 5 Hib/MenC + PCV
2 инъекции

Малышам в возрасте 2-х и 4-х месяцев после введения вакцины MenB следует давать 3 дозы детского парацетамола в виде суспензии.

1. Первую дозу детского парацетамола в виде суспензии в объеме 2,5 мл (60 мг) следует давать малышу во время или сразу после введения вакцины.
2. Вторую дозу в объеме 2,5 мл (60 мг) следует давать через 4–6 часов после первой дозы.
3. Третью дозу в объеме 2,5 мл (60 мг) следует давать через 4–6 часов после второй дозы.



Вам необходимо посетить
своего семейного врача
(врача) пять раз

www.immunisation.ie

Код заказа: HNI00984



Seirbhís Sláinte
Níos Fearr
á Forbairt

Building a
Better Health
Service