




















Calendar pentru imunizarea copiilor

Nou-născuți	La 2 luni (2 months)	La 4 luni (4 months)	La 6 luni (6 months)	La 12 luni(12months)	La 13 luni(13months)
					
Întrebați doctorul	6 în 1 + PCV + Men B + Rotavirus – picături,oral	6 în 1 + Men B + Rotavirus – picături,oral	6 în 1 + PCV + Men C	MMR + Men B	Men C/Hib + PCV
<p>New-borns</p> <p>Întrebați doctorul dacă nou-născutul trebuie vaccinat la naștere.</p>	<p>Se administrează oral paracetamol lichid.</p> <p>Vaccin împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei ✓ Tetanosului ✓ Poliomielitei ✓ Tusei convulsive (tuse măgărească) ✓ Haemophilus Influenzae tip B ✓ Hepatitei tip B ✓ Infecții cu Pneumococ ✓ Meningitei tip B ✓ Rotavirusului (cauza gastroenteritei) 	<p>Se administrează oral paracetamol lichid.</p> <p>Vaccin împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei ✓ Tetanosului ✓ Poliomielitei ✓ Tusei convulsive (tuse măgărească) ✓ Haemophilus Influenzae tip B ✓ Hepatitei tip B ✓ Meningitei tip B ✓ Rotavirusului (cauza gastroenteritei) 	<p>Copilul este vaccinat împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei ✓ Tetanosului ✓ Poliomielitei ✓ Tusei convulsive (tuse măgărească) ✓ Haemophilus Influenzae tip B ✓ Hepatitei tip B ✓ Infecțiilor cu Pneumococ ✓ Meningitei tip C 	<p>Copilul este vaccinat împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pojarului ✓ Oreionului ✓ Rubeolei ✓ Meningitei tip B 	<p>Copilul este vaccinat împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningitei tip C ✓ Haemophilus Influenzae tip B ✓ Infecțiilor cu Pneumococ
	<p>La medicul de familie.</p> 	<p>La medicul de familie.</p> 	<p>La medicul de familie.</p> 	<p>La medicul de familie.</p> 	<p>La medicul de familie.</p> 

Calendar pentru imunizarea copiilor

Primul an de școală primară La vârsta de 4 – 5 ani (1st year of primary school)	Primul an de liceu (1st year of secondary school)	Primul an de liceu (1st year of secondary school)	Primul an de liceu (1st year of secondary school)
			
4 în 1 + MMR	HPV (2 sau 3 doze)	Tdap	MenC
<p>Băieții și fetele sunt vaccinate împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei ✓ Tusei convulsive (tuse măgărească) ✓ Poliomielitei ✓ Tetanosului ✓ Pojarului ✓ Oreionului ✓ Rubeolei 	<p>Fetele sunt vaccinate împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Papilomavirusului uman, provoacă cancerul de col uterin <p>Se administrează o doză la 6 luni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 doze pentru fetele cu vârsta sub 15 ani ➤ 3 doze pentru fetele cu vârsta de 15 ani și peste 	<p>Băieții și fetele sunt vaccinate împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tetanosului ✓ Difteriei ✓ Tusei convulsive (tuse măgărească) 	<p>Băieții și fetele sunt vaccinate împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningitei tip C
<p style="text-align: center;">Copilul este vaccinat la școală.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div>	<p style="text-align: center;">Fata este vaccinată la școală.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div>	<p style="text-align: center;">Copilul este vaccinat la școală.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div>	<p style="text-align: center;">Copilul este vaccinat la școală.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div>