

PAS IMDHÍONTA



www.immunisation.ie

Ainm

Dáta
breithe

Is doiciméad tábhachtach é seo agus ba cheart é a
choimeád in áit shábháilte.



Réamheolas

Is é aidhm an Phas Imdhíonta seo ná a chinntiú go bhfuil taifead agat ar d'imeadh go léir.

Ba cheart iad seo a leanas ar fad a chuimsiú sa taifead seo:

- **príomh-imdhíontaí mar leanbh,**
- **imeadhíontaí ar scoil,**
- **taisteal, agus**
- **imeadhíontaí mar dhuine fásta**

D'fhéadfaí go mbeadh vacsaíní eile ag teastáil uait ó am go chéile tar éis ráige galair nó le haghaidh oibre nó taistil. Is féidir na vacsaíní sin a chlárú sa leabhrán seo freisin.

Tabhair an Pas Imdhíonta seo leat gach uair a fhreastalaíonn tú ar choinne imeadhíonta, le do thoil.

Ainm

Aitheanta chomh maith mar

Dáta Breithe

Ionad Breithe

Seoladh

Uimhir Theagmhála

Fón Póca

Seoladh Ríomhphoist

Aitheantóir Uathúil Sláinte

Uimh. PSP

Ailléirgí

I gCás Éigeandála

Ainm(neacha)

Uimhir Theagmhála

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Docht

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Coinnigh an leabhrán seo in áit shábháilte agus tabhair leat é chuig gach coinne vacsaínithe.

Léiríonn an tábla thíos cén aois ag a ndéantar imdhíonadh ar leanaí, cá háit a ndéantar é agus cé na vacsaíní a bhíonn i gceis.

Cén uair

Cá háit

Vacsaíniú



Lialann
Cuairt 1

6 in 1+PCV+MenB+Rótavíreas
3 Instealladh + Braonta Béil



Lialann
Cuairt 2

6 in 1+MenB+Rótavíreas
2 Instealladh + Braonta Béil



Lialann
Cuairt 3

6 in 1+PCV+MenC
3 Instealladh

Ní thugtar vacsaín rótaivíris ag 8 mí 0 lá nó ina dhiaidh sin



Lialann
Cuairt 4

MMR+MenB
2 Instealladh



Lialann
Cuairt 5

Hib/MenC+PCV
2 Instealladh



Naíonáin bheaga (an chéad bhliain sa bhunscoil)	Scoil*	4 vacsaín in 1 cheann amháin + MMR
An chéad bhliain den mheánscoil (cailíní amháin)	Scoil	HPV (2 doses)
An chéad bhliain den mheánscoil	Scoil	Tdap
An chéad bhliain den mheánscoil	Scoil	MenC
Gach bliain (idir Deireadh Fómhair agus Aibreán)	Dochtúir teaghlach nó poitigéir	Flu**

* Níl na vacsaíní seo le fáil ach ón dochtúir teaghlach i Sligeach, i Liatroim agus i nDún na nGall.

** Dóibh siúd atá 65 bliana d'aois nó níos sine agus i ngrúpaí atá i mbaol.

6 vacsaín in 1 Diphtheria, Haemophilus influenzae b (Hib), Hepatitis B, Triuch, Póilió agus Teiteanas

PCV Vacsaín níumacocúil chomhchuingeach

MenB Ionfhabhtú Meningeacocúil B

Rótavíreas Vacsaín bhéil rótaivíris

MenC Ionfhabhtú Meningíteas meningeacocúil C

BLBD Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg

Hib/MenC Vacsaín chomhcheangailte Haemophilus influenzae b + Ionfhabhtú Meningíteas meningeacocúil C

4 in 1 Diphtheria, Pertussis (whooping cough), Polio, Tetanus

HPV Human papillomavirus

Tdap Tetanus, low dose diphtheria and acellular pertussis (whooping cough)

Flu Influenza

Príomh-imdhíonadh Óige

Ainm na vacsaíne	Aois a thugtar é	Déantóir	Cnuasuimhir
------------------	------------------	----------	-------------

Cuairt 1 ar an Dochtúir Teaghlach 2 mhí

6 in 1

PCV

MenB

Rota

Cuairt 2 ar an Dochtúir 4 mhí

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1

MenB

Rota

Cuairt 3 ar an Dochtúir 6 mhí

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1

PCV

MenC

6 vacsaín in 1 Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitéas B,
Triuch, Póilió, Teiteanas
MenC Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C

Ainm

Dáta breithe

Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta
-----------	----------------	-----------	------







PCV
MenB
Róta

Vacsaín níúmacocúil chomhchuingeach
Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Rótavíreas

Príomh-imdhíonadh Óige

Ainm na vacsaíne

Aois a thugtar é

Déantóir

Cnuasuimhir

Cuairt 4 ar an Dochtúir Teaghlach **12 mhí**

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

BLBD

MenB

Cuairt 5 ar an Dochtúir Teaghlach **13 mhí**

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

Hib/MenC

PCV

Eile

BLBD

Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg

MenB

Ionfhabhtú Meiningeacocúil B

PCV

Vacsaín níumacocúil chomhchuingeach

Hib/MenC

Haemophilus influenzae b / Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C

Imdhíonadh Scoile

Ainm na vacsaíne	Aois a thugtar é	Déantóir	Cnuasuimhir
4 vacsaín in 1			
BLBD			
Tdap			
MenC			
HPV, dáileog 1			

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

HPV, dáileog 2			
Eile			

4 vacsaín in 1
BLBD
Tdap

Diftéire, Triuch, Póilió, Teiteanas
Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Teiteanas, dáileog íseal diftéire agus triuch éigeallach

Comhairle iar-vacsáinthe

Céard iad na frithghníomhartha coitianta a d'fhéadfadh teacht ar mo leanbh tar éis dó/di a bheith vacsaínithe agus céard ba chóir dom a dhéanamh?

Frithghníomh coitianta	Cad ba chóir a dhéanamh
Bíonn sé coitianta fiabhras a fháil tar éis vacsaín MenB ag aois 2 agus 4 mhí (cuairt 1 agus 2)	Tabhair paraicéiteamól leachtach naíonáin <ol style="list-style-type: none">1. Tabhair 2.5 ml (60 mg) tráth a thugtar an vacsaín nó go gairid ina dhiaidh sin.2. Tabhair an dara dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis na chéad dáileoige.3. Tabhair an tríú dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an dara dáileoige.4. Tabhair an ceathrú dáileog idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an tríú dáileog má bhíonn fiabhras ar an leanbh i gcónaí.
Tinneas, at* agus deargadh in áit an insteallta	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis agus pianta a fhuascailt. Déan deimhin de nach bhfuil éadaí ró-chúng nó ag cuimilt i gcoinne áit an insteallta.
Buinneach éadrom tar éis na vacsaíne rótaivíris	Tabhair breis bainne le hól. Nigh do lámha go cúramach tar éis clúidín do linbh a athrú agus a chur sa bhosca bruscair.
Fiabhras (os cionn 39°C)	Ná cuir an iomarca éadaí ar an leanbán. Bí cinnte de nach bhfuil a s(h)eomra ró-the. Tabhair sreabháin breise le n-ól. Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun an fiabhrais a ísliú.
Tinneas cinn nó greannaitheacht	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis agus pianta a fhuascailt.

* I gcás páistí scoile, d'fhéadfaí go mbeadh an sciathán ata ón ngualainn go dtí an uillinn. Is gnách go dtarlaíonn sé seo taobh istigh de dhá lá tar éis na vacsaíne agus éiríonn sé níos fearr tar éis 4-5 lá. Níl gá le hantaibheathaigh chun an frithghníomhú logánta seo a chóireáil.

- Tá an dáileog de pharaicéiteamól nó iobúpróifein a mholtar do do leanbh scríofa ar an mbuidéal agus braitheann sé ar aois an linbh.
- Iarr ar do phoítigéir meascán paraicéiteamóil nó iobúpróifeine gan siúcra atá oiriúnach d'aois do linbh a thabhairt duit.
- Is féidir le húsáid paraicéiteamóil nó iobúpróifeine thar tréimhse fhada gan chomhairle ó dhochtúir dochar a dhéanamh.

Má tugadh vacsaín MMR do do leanbh, b'fhéidir go dtiocfadh gríos air/uirthi 6-10 lá ina dhiaidh sin (bruitíneach bheag). Níl sé seo tógálach.

Notaí



Arna fhoilsiú ag: Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS
Dáta foilsithe: Meán Fómhair 2018
Cód ordaithe: HNI00936