

ინფორმაცია იმ ბავშვების მშობლებისთვის, რომლებიც არიან **Junior Infants** (დაწყებითი სკოლის პირველკლასში)

4 ერთში & MMR (წწყ)

ვაქცინები

4 ერთში ვაქცინა

რა არის 4 ერთში ვაქცინის სახელწოდება?

4 ერთში ვაქცინას ჰქვია ტეტრავაკი (Tetravac).

რა არის 4 ერთში ვაქცინა?

4 ერთში ეწოდება ვაქცინას, რომელიც იცავს დიფტერიის, პოლიომიელიტის, ტეტანუსისა და ყივანახველსგან. ყველ ეს ინფექცია მძიმე დაავადება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჰოსპიტალიზაცია ან ყველზეცუდ შემთხვევაში - სიკვდილი.

დაავადებები, რომელსგანაც იცავს	გავრცელებული სიმპტომები	შესაძლო გართულებები
ტეტანუსი	კუნთის მტკივნეული სპაზმები	კონვულსიები (კრუნჩხვები) ყბის კუნთების სპაზმი სიკვდილი
დიფტერია	ყელის ტკივილი აჩქარებული გულსცემა	სუნთქვის გაძნელება დამბლა გულს უკმარისობა სიკვდილი
ყივანახველს	შემაწუხებელი, ყვილის მაგვარი ხველს	სუნთქვის გაძნელება გულს და ფილტვის უკმარისობა სიკვდილი
პოლიომიელიტი	ცხელება თავის ტკივილი ღებინება	დამბლა სიკვდილი

ვის სჭირდება 4 ერთში ვაქცინა?

თქვენს შვილს უნდა გაუკეთდეს ამ დაავადებებისგან დამცავი ვაქცინები ორი, ოთხი და ექვსი თვის ასაკში, როგორც ნერთში ვაქცინის ნაწილი.

თქვენი შვილს იმუნიტეტის გასაძლიერებლად და ამავე დებების წინააღმდეგ დამატებითი დაცვის უზრუნველსაყოფად, დამატებითი დოზა საჭიროა დაწყებითი სკოლს პირველკლასში (Junior Infants).

არსებობენ ისეთი ბავშვები, რომლებმაც არ უნდა გაიკეთონ 4 ერთში ვაქცინა?

ძალიან ცოტაა ისეთი ბავშვი, რომელმაც არ უნდა გაიკეთოს 4 ერთში ვაქცინა. თქვენმა შვილმა არ უნდა გაიკეთოს აცრა, თუკი მას ჰქონდა მწვავე ალერგიული რეაქცია (ანაფილქსია) წინა ვაქცინაზე ან ვაქცინის რომელიმე ნაწილზე ან ჰქონდა მწვავე ალერგიული რეაქცია ანტიბიოტიკებზე - პოლიმიქსინი ბ, სტრეპტომიცინი და ნეომიცინი.

თქვენ უნდა გადადოთ 4 ერთში ვაქცინის გაკეთება, თუკი თქვენი შვილი:
 • ავადაა მალაღობით.

აქვს თუ არა 4 ერთში ვაქცინას რაიმე გვერდითი მოვლენა?

ბავშვების უმრავლესობას ამ ვაქცინის შემდეგ არანაირი პრობლემა არ აქვს.

ყველაზე ხშირი გვერდითი მოვლენა არის მტკივანი, წითელი ან შეშუპებული მკლავი. იშვიათ შემთხვევაში მკლავის შეშუპება შესაძლოა შეინიშნებოდეს მხრიდან იდაყვამდე. ეს, როგორც წესი, ხდება აცრიდან 2 დღის განმავლობაში და 4-5 დღეში გაივლის. ანტიბიოტიკი საჭირო არ არის ამ ადგილობრივი რეაქციის სამკურნალოდ. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ პარაცეტამოლი ან იბუპროფენი. ასევე უნდა მიადებინოთ დიდიოდენობით სითხე. დაწმუნდით, რომ თქვენს შვილს არ სცხელა და რომ ტანსაცმელი არ ეხახუნება ნანემსარადგილს.

უფრო იშვიათად ბავშვებს შესაძლოა ჰქონდეთ სიცხე ან თავის ტკივილი ან თავს ცუდადგრძობდნენ.

MMR ვაქცინა

რა ჰქვია MMR ვაქცინას?

MMR ვაქცინას ჰქვია პრიორიქსი (Priorix) ან ემ-ემ-ერვაქსპრო (MMRVaxPro).

რა არის MMR ვაქცინა?

MMR ვაქცინა იცავს თქვენს შვილს წითელს, წითურას და ყბაყურასგან.

წითელს, წითურას და ყბაყურას გამომწვეულია ვირუსებით და ძლიერ გადამდები დაავადებებია. ისინი ვრცელდება, როცა ვირუსი გადაეება დაავადებული ადამიანისგან იმ პირს, რომელსაც არაქვს მის საწინააღმდეგო დაცვა.

დაავადებები, რომელსგანაც იცავს	გავრცელებული სიმპტომები	შესაძლო გართულებები
წითელს	ცხელება გამონაყარი და წითლებული და მტკივანი თვალბი	ენცეფალიტი (ტვინის შეშუპება) პნევმონია ბრონქიტი ყურის ინფექციები
ყბაყურა	ყბის ქვეშ მტკივანი და შესიებული ჯირკვლები და ცხელება	მენინგიტი სიყრუე შეშუპებული, მტკივანი საკვრცხეები ზრდასრულ

		მამაკაცებში
წითურა	ცხელება და გამონაყარი	თუკი ორსული ქალი დაავადდა წითურით, მის შვილს შესაძლოა განუვითარდეს მნიშვნელოვანი თანდაყოლილი დეფექტები, მათ შორის სიბრმავე, ტვინის დაზიანება, სიყრუე

ვის სჭირდება MMR ვაქცინა?

თქვენს შვილს უნდა გაუკეთდეს MMR ვაქცინა 12 თვის ასაკში. ბავშვებს მეორე დოზა უნდა გაუკეთდეს დაწყებული სკოლის პირველკლასში (Junior Infants). MMR ვაქცინის ორი დოზა თქვენი შვილს თვის საუკეთესო დაცვას უზრუნველყოფს.

თუკი თქვენს შვილს აქამდე არასოდეს გაუკეთებია MMR ვაქცინა, მაშინ მან მეორე დოზა პირველი დოზიდან 1 თვის შემდეგ უნდა გაიკეთოს.

არსებობენ ისეთი ბავშვები, რომლებმაც არ უნდა გაიკეთონ MMR ვაქცინა?

ძალიან ცოტაა ისეთი ბავშვი, რომელმაც არ უნდა გაიკეთოს MMR ვაქცინა. თქვენმა შვილმა არ უნდა გაიკეთოს ვაქცინა, თუკი მას ჰქონდა მწვავე ალერგიული რეაქცია (ანაფილქსია) წინა MMR ვაქცინაზე ან მის რომელიმე ნაწილზე ან ნეომიცინზე ან ქულტინზე, რომელსაც შეიცავს MMR ვაქცინა.

თქვენ უნდა გადადოთ MMR ვაქცინის გაკეთება, თუკი თქვენი შვილი:

- ავადა მალაღი სიცხით
- კორტიკოსტეროიდების მალაღი დოზას იღებს
- გადის ქიმიოთერაპიის ან რადიოთერაპიის კურსს
- აქვს რაიმე სნეულება ან დაავადება, რაც ზეგავლენას ახდენს იმ ურსის ტემპზე.

არის თუარა რაიმე კავშირი MMR ვაქცინასა და აუტიზმს შორის?

არა. კვლევამ აჩვენა, რომ არავითარი კავშირი MMR ვაქცინასა და აუტიზმს შორის არ არის.

აქვს თუარა MMR ვაქცინას რაიმე გვერდითი მოვლენა?

ბავშვების უმრავლესობას ამ ვაქცინის შემდეგ არანაირი პრობლემა არ აქვს. ^{ბევრდითი} მოვლენები გაცილებით უფრო იშვიათია MMR ვაქცინის მე-2 დოზის შემდეგ.

ზოგიერთ ბავშვს შესაძლოა განუვითარდეს ნანემსარადგილს შეშუპება და სიწითლე ან შეაწუხოს ტკივილი. იშვიათად ბავშვებს შესაძლოა დაემართოს "მინი წითელა" გამონაყარით და სიცხით 6-10 დღის შემდეგ. ბავშვებს შესაძლოა დაემართოს "მინი ყბაყურა" ყბის არეში შეშუპებით აცრის გაკეთებიდან მესამე კვირას. ეს გადამდები არ არის.

4 ერთში და MMR ვაქცინები ერთდღეს კეთდება და თქვენს შვილს გაუკეთდება თითო აცრა თითო მკლავში.

თქვენი შვილი და ცუდი უნდა იყვნენ ამ 7 ინფექციური დაავადებისგან სკოლს დაწყებისას.

თქვენმა შვილმა უკვე გაიკეთა აცრები დიფტერიის, პოლიომიელიტის, ტეტანუსის, ყივანახველს, წითელს, წითურას და ყბაყურას წინააღმდეგ ჩვილობის დროს. ამ დაავადებების საწინააღმდეგო იმუნიტეტი დროთა განმავლობაში მცირდება, ამიტომ რეკომენდებულია გამაძლიერებელი (ბუსტერ) დოზა დამატებითი დაცვის უზრუნველსაყოფად.

თქვენი შვილს იმუნურ სისტემას მარტივად შეუძლია გაუმკლავდეს ამ ვაქცინებს. ეს ვაქცინები ერთადვე იმისთვის, რომ თქვენს შვილს ამ დაავადებების წინააღმდეგ საუკეთესო დაცვა ჰქონდეს.

როგორ უნდა გაუკეთდეს ეს ვაქცინები თქვენს შვილს?

ეს ვაქცინები შედის გაერთიანებული სამეფოს ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სააგენტოს (HSE) სკოლის იმუნიზაციის პროგრამაში. თქვენ მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას და თანხმობის ფორმას თქვენი შვილსთვის აცრის გაკეთებამდე.

დონეგალში, სლიგოსა და ლიტრიმში ეს ვაქცინები კეთდება თქვენი ექიმის-თერაპევტის მიერ. ამ საგრაფოებში თქვენ მიიღებთ წერილს HSE-სგან, რომ ლთაც გთხოვთ, მიხვიდეთ თქვენს ექიმ-თერაპევტთან აცრის გაკეთების დროს.

შეიძლება ჩემი შვილსთვის COVID-19-ის აცრის და სხვა აცრის გაკეთება?

სიფრთხილსთვის, რეკომენდებულია, რომ ამ ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებისთვის, COVID-19 ვაქცინა და ნებისმიერი სხვა ვაქცინა განცალკევებული იყოს 14 დღით.

როგორ შეიძლება თქვენი შვილი მოემზადოს ვაქცინაციის დღისთვის?

აცრის დღეს თქვენმა შვილმა უნდა:

- ისაუზმოს
- ეცვათ თავის უფალო, მოკლე სახელოებიანი ზედა
- თუ შესაძლებელია, სკოლაში თან იქონიოს მისი იმუნიზაციის პასპორტი.

რა ხდება თუკი თქვენი შვილი გააცდენს სკოლის ვაქცინაციის დღეს?

თქვენი შვილი მაინც შეიძლება აცრების გაკეთება. HSE უზრუნველყოფს თქვენი შვილსთვის აცრის გაკეთებას HSE-ის კლინიკაში ან შესაძლოა გთხოვთ თქვენი შვილს მიყვანა თქვენს ექიმ-თერაპევტთან აცრის გასაკეთებლად.

რა ხდება მაშინ, როცა თქვენს შვილს სჭირდება MMR ვაქცინის მეორე დოზა?

HSE უზრუნველყოფს თქვენი შვილსთვის აცრის გაკეთებას.

თანხმობის ფორმა ვაქცინებისთვის

თქვენ უნდა წაიკითხოთ და ხელი მოაწეროთ ამ პაკეტში მოთავსებულ თანხმობის ფორმას და დაუბრუნოთ ის სკოლს, იმისთვის რომ თქვენს შვილს ვაქცინები გაუკეთდეს სკოლაში.

HSE-ის სკოლის ვაქცინაციის პროგრამა შესაძლოა განხორციელდეს სხვა ადგილს ან გადაიდოს COVID-19-ის გამო.

დამატებითი ინფორმაცია

თუკი გაქვთ რაიმე კითხვები, გთხოვთ, განიხილოთ ისინი თქვენი HSE-ის სკოლის ვაქცინაციის პროგრამის ჯგუფის წევრთან, თქვენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექთანთან ან თქვენს ექიმ-თერაპევტთან.

ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს **www.immunisation.ie** ამ ინფექციური დაავადებების და ვაქცინების შესახებ მეტი ინფორმაციის წასაკითხად.

თქვენ შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ვაქცინებზე პაციენტთა საინფორმაციო ბროშურების ბმული მისამართზე: **www.hpra.ie**. მოიძიეთ ტეტრავაკი (4 ერთში), პრიორიქსი ან ემ-ემ-ერვაქსპრო (MMR), იმისთვის, რომ წაიკითხოთ პაციენტის საინფორმაციო ბროშურა.

ეს ბროშურა მოამზადა: HSE-ის ეროვნული იმუნიზაციის სამსახურმა გამოსცემის თარიღი: ივნისი 2022