

PAS IMDHÍONTA



www.immunisation.ie

Ainm

Dáta
breithe

Is doiciméad tábhachtach é seo agus ba cheart é a
choimeád in áit shábháilte.



Réamheolas

Is é aidhm an Phas Imdhíonta seo ná a chinntiú go bhfuil taifead agat ar d'imdhíonadh go léir.

Ba cheart iad seo a leanas ar fad a chuimsiú sa taifead seo:

- **príomh-imdhíontaí mar leanbh,**
- **imdhíontaí ar scoil,**
- **taisteal, agus**
- **imdhíontaí mar dhuine fásta**

D'fhéadfaí go mbeadh vacsaíní eile ag teastáil uait ó am go chéile tar éis ráige galair nó le haghaidh oibre nó taistil. Is féidir na vacsaíní sin a chlárú sa leabhrán seo freisin.

Tabhair an Pas Imdhíonta seo leat gach uair a fhreastalaíonn tú ar choinne imdhíonta, le do thoil.

Ainm

Aitheanta chomh maith mar

Dáta Breithe

Ionad Breithe

Seoladh

Uimhir Theagmhála

Fón Póca

Seoladh Ríomhphoist

Aitheantóir Uathúil Sláinte

Uimh. PSP

Ailléirgí

I gCás Éigeandála

Ainm(neacha)

Uimhir Theagmhála

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Docht

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Coinnigh an leabhrán seo in áit shábháilte agus tabhair leat é chuig gach coinne vacsaínithe.

Léiríonn an tábla thíos cén aois ag a ndéantar imdhíonadh ar leanaí, cá háit a ndéantar é agus cé na vacsaíní a bhíonn i gceis.

Cén uair

Cá háit

Vacsaíniú



Lialann
Cuairt 1

**6 in 1+PCV+MenB+Rótavíreas
3 Instealladh + Braonta Béil**



Lialann
Cuairt 2

**6 in 1+MenB+Rótavíreas
2 Instealladh + Braonta Béil**



Lialann
Cuairt 3

**6 in 1+PCV+MenC
3 Instealladh**

Ní thugtar vacsaín rótaivíris ag 8 mí 0 lá nó ina dhiaidh sin



Lialann
Cuairt 4

**MMR+MenB
2 Instealladh**



Lialann
Cuairt 5

**Hib/MenC+PCV
2 Instealladh**



Naíonáin bheaga ((an chéad bhliain sa bhunscoil))	Scoil*	4 vacsaín in 1 cheann amháin + MMR
An chéad bhliain sa mheánscoil	Scoil	HPV (2 doses)
An chéad bhliain sa mheánscoil	Scoil	Tdap
An chéad bhliain sa mheánscoil	Scoil	MenACWY
Gach bliain (idir Deireadh Fómhair agus Aibreán)	Dochtúir teaghlach nó poitigéir	Flu**

* Níl na vacsaíní seo le fáil ach ón dochtúir teaghlach i Sligeach, i Liatroim agus i nDún na nGall.

** Dóibh siúd atá 65 bliana d'aois nó níos sine agus i ngrúpaí atá i mbaol.

6 vacsaín in 1	Diphtheria, Haemophilus influenzae b (Hib), Hepatitis B, Triuch, Póilió agus Teiteanas
PCV	Vacsaín níumacocúil chomhchuingeach
MenB	Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Rótavíreas	Vacsaín bhéil rótaivíris
MenC	Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C
BLBD	Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Hib/MenC	Vacsaín chomhcheangailte Haemophilus influenzae b + Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C
4 vacsaín in 1	Diftéire, Triuch, Póilió, Teiteanas
HPV	Papalómaivíreas daonna
Tdap	Teiteanas, dáileog íseal diftéire agus triuch éigeallach
MenACWY	ACWY meiningeacocúil
Fliú	Influenza

Príomh-imdhíonadh Óige

Ainm na vacsaíne

Aois a thugtar é

Déantúsóir

Cnuasuimhir

Cuairt 1 ar an Dochtúir Teaghlach 2 mhí

6 in 1

PCV

MenB

Rota

Cuairt 2 ar an Dochtúir 4 mhí

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1

MenB

Rota

Cuairt 3 ar an Dochtúir 6 mhí

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1

PCV

MenC

6 vacsaín in 1

Díféire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitéas B,
Triuch, Póilió, Teiteanas
Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C

MenC

Ainm

DB

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

PCV
MenB
Róta

Vacsaín níumacocúil chomhchuingeach
Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Rótavíreas

Príomh-imdhíonadh Óige

Ainm na vacsaíne	Aois a thugtar é	Déantúsóir	Cnuasuimhir
------------------	------------------	------------	-------------

Cuairt 4 ar an Dochtúir Teaghlach 12 mhí

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

BLBD			
MenB			

Cuairt 5 ar an Dochtúir Teaghlach 13 mhí

Hib/MenC			
PCV			

Eile

Fliú			

BLBD

MenB

PCV

Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Ionfhabhtú Meiningeacócúil B
Vacsaín níúmacócúil chomhchuingeach

Ainm

DB

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

**Hib/MenC
Fliú**

Haemophilus influenzae b / Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C
Vacsaín fliú

Imdhíonadh Scoile

Ainm na vacsaíne	Déantúsóir	Cnuasuimhir
------------------	------------	-------------

BUNSCOIL

4 vacsaín in 1	
BLBD	

MEÁNSCOIL

Tdap	
MenACWY	
HPV, dáileog 1	
HPV, dáileog 2	

4 vacsaín in 1	Diftéire, Triuch, Póilió, Teiteanas
BLBD	Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Tdap	Teiteanas, dáileog íseal diftéire agus triuch éigeallach

Ainm

DB

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

Ainm

DB

[illegible]

Comhairle iar-vacsáinithe

Céard iad na frithghníomhartha coitianta a d'fhéadfadh teacht ar mo leanbh tar éis dó/di a bheith vacsaínithe agus céard ba chóir dom a dhéanamh?

Frithghníomh coitianta	Cad ba chóir a dhéanamh
Bíonn sé coitianta fiabhras a fháil tar éis vacsaín MenB ag aois 2 agus 4 mhí (cuairt 1 agus 2)	Tabhair paraicéiteamól leachtach naíonáin 1. Tabhair 2.5 ml (60 mg) tráth a thugtar an vacsaín nó go gairid ina dhiaidh sin. 2. Tabhair an dara dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis na chéad dáileoige. 3. Tabhair an tríú dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an dara dáileoige. 4. Tabhair an ceathrú dáileog idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an tríú dáileog má bhíonn fiabhras ar an leanbh i gcónaí.
Tinneas, at* agus deargadh in áit an insteallta	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis agus pianta a fhuascailt. Déan deimhin de nach bhfuil éadaí ró-chúng nó ag cuimilt i gcoinne áit an insteallta.
Buinneach éadrom tar éis na vacsaíne rótaivíris	Tabhair breis bainne le hól. Nigh do lámha go cúramach tar éis clúidín do linbh a athrú agus a chur sa bhosca bruscair.
Fiabhras	Ná cuir an iomarca éadaí ar an leanbán. Bí cinnte de nach bhfuil a s(h)eomra ró-the. Tabhair sreabháin breise le n-ól. Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun an fiabhrais a íslíú.
Tinneas cinn nó greannaitheacht	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis agus pianta a fhuascailt.

* D'fhéadfaí go mbeadh an sciathán ata ón ngualainn go dtí an uillinn tar éis an vacsaín 4 in 1 a thabhairt do Naíonáin Bheaga. Is gnách go dtarlaíonn sé seo taobh istigh de dhá lá tar éis an vacsaínithe agus éiríonn sé níos fearr tar éis 4-5 lá. Níl gá le hantaibheathaigh chun an frithghníomhú logánta seo a chóireáil.

- Iarr ar do phoitigéir meascán paraicéiteamóil nó iobúpróifeine atá oiriúnach d'aois do linbh a thabhairt duit.
- Tá an dáileog de pharaicéiteamól nó iobúpróifein a mholtar do do leanbh scríofa ar an mbuidéal agus braitheann sé ar aois an linbh.
- Is féidir le húsáid paraicéiteamóil nó iobúpróifeine thar tréimhse fhada gan chomhairle ó dhochtúir dochar a dhéanamh.

Má tugadh vacsaín MMR do do leanbh, b'fhéidir go dtiocfadh gríos air/uirthi 6-10 lá ina dhiaidh sin (bruitíneach bheag). Níl sé seo tógálach.

Tugtar comhairle iarchúraim vacsaínithe ar an lá céanna.

Notaí



Arna fhoilsiú ag: Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS
Dáta foilsithe: Aibreán 2020
Cód ordaithe: HNI00936GA