

# Vos doses de rappel contre la COVID-19

pour les personnes de  
50 ans et plus et celles de  
16 à 49 ans souffrant d'un  
problème de santé ou d'un  
système immunitaire faible



**COVID-19  
VACCINE**  
Public Health  
Advice

Publié par HSE le  
19 décembre 2022

Version 3



Rialtas na hÉireann  
Government of Ireland

## Ces informations sont destinées aux personnes qui sont :

- âgés de 50 ans ou plus
- âgés de 16 à 49 ans et souffrant d'un problème de santé qui les expose à un risque élevé de maladie grave s'ils attrapent la COVID-19 (y compris les personnes dont le système immunitaire est faible) ou s'ils vivent dans un établissement de soins de longue durée

## Pourquoi devrais-je me faire vacciner à nouveau contre la COVID-19 ?

Il est important que vous soyez à jour dans la vaccination contre la COVID-19, **même si vous êtes déjà vacciné ou si vous avez eu la COVID-19. Les raisons sont les suivantes :**

- la protection que vous avez obtenue grâce à vos vaccins précédents ou à une infection par la COVID-19 peut s'affaiblir avec le temps
- vous pouvez avoir un risque plus élevé de maladie grave si vous attrapez la COVID-19

Les vaccins de rappel augmentent votre protection contre la COVID-19. Sans eux, vous risquez davantage de tomber gravement malade si vous attrapez la COVID-19.

## Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 devrais-je avoir reçues ?

Le National Immunisation Advisory Committee (NIAC) émet les recommandations suivantes :

- vous devez avoir reçu votre première série de vaccins contre la COVID-19 (généralement 2 doses, sauf pour les personnes qui ont reçu la dose unique du vaccin COVID-19 Janssen). Si vous êtes immunodéprimé (système immunitaire faible), vous devez avoir reçu une dose supplémentaire dans le cadre de votre traitement principal;
- vous devriez ensuite recevoir votre première dose de rappel;
- celle-ci doit être suivie d'une deuxième dose de rappel;
- si vous êtes âgé de 65 ans et plus ou si vous êtes immunodéprimé (système immunitaire faible), vous pouvez désormais recevoir une troisième dose de rappel;
- si vous avez entre 16 et 64 ans, que vous souffrez d'une maladie sous-jacente et que vous n'avez pas reçu de vaccin COVID-19 adapté, vous pouvez recevoir un troisième rappel qui sera un vaccin adapté. Vous trouverez des informations sur les vaccins adaptés à la page suivante.

## Quand dois-je recevoir une dose de rappel ?

Vous devez recevoir votre rappel au moins 4 mois après votre dernier vaccin contre la COVID-19.

Si vous avez été vacciné contre la COVID-19, vous devez attendre au moins 4 mois après le début de vos symptômes ou après avoir été testé positif avant de recevoir la dose de rappel.

## Quel vaccin me sera proposé pour mon rappel ?

Trois vaccins COVID-19 à ARNm adaptés ont été recommandés comme doses de rappel par le National Immunisation Advisory Committee (NIAC) en Irlande, suite à l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Ces vaccins sont :

- Comirnaty® BA.1 (vaccin Pfizer)
- Comirnaty® BA.4-5 (vaccin Pfizer)
- Spikevax® BA.1. (vaccin Moderna)

Alors que tous les vaccins précédents offrent une protection contre la COVID-19, les vaccins adaptés devraient offrir une protection plus large contre les variantes de la COVID-19.

## Comment peut-on savoir si les rappels sont sûrs ?

Nous disposons de moins d'informations sur la sécurité de la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 et des suivantes. Cependant, de nombreux pays ont administré à leur population plusieurs doses de vaccins contre la COVID-19. Selon les études, il n'y a pas eu jusqu'à présent de problèmes de sécurité inattendus chez les personnes ayant reçu plusieurs doses de rappel.

On s'attend à ce que la sûreté des vaccins adaptés soit similaire à celle des vaccins précédents. La sûreté des vaccins continuera d'être surveillée par l'EMA.

Tous les vaccins adaptés contiennent du Trometamol et vous ne pouvez donc pas les recevoir si vous avez eu une anaphylaxie (réaction allergique grave) au Trometamol.

## Les vaccins de rappel sont-ils autorisés par l'Agence européenne des médicaments (EMA) ?

Les deuxièmes rappels ou les rappels ultérieurs des vaccins à ARNm n'ont pas été approuvés par l'EMA. Cependant, l'EMA et le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) ont émis un avis selon lequel une deuxième dose de rappel du vaccin à ARNm contre la COVID-19 peut être administrée aux personnes âgées de 60 ans ou plus et aux personnes présentant des problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de maladie, car une deuxième dose de rappel leur offrira une meilleure protection.

Les recommandations du NIAC peuvent varier de celles de l'EMA en raison de données et de considérations locales. En Irlande, nous suivons les conseils du NIAC.

## Puis-je recevoir un vaccin contre la COVID-19 en même temps que le vaccin contre la grippe ?

Oui. Si vous devez recevoir un vaccin contre la grippe, vous pouvez recevoir tout vaccin contre la COVID-19 en même temps.

## Informations complémentaires

Pour en savoir plus, consultez le site [hse.ie/covid19vaccine](https://www.hse.ie/covid19vaccine) ou appelez notre équipe de HSELive au 1800 700 700. Le bureau est ouvert de 8 h 00 à 20 h 00 du lundi au vendredi et de 9 h 00 à 17 h 00 le samedi et le dimanche.

Vous pouvez également en parler à votre médecin généraliste, votre infirmière, votre pharmacien ou votre vaccinateur.

Publié par HSE le  
19 décembre 2022

Version 3



Rialtas na hÉireann  
Government of Ireland