



**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice

Бустери проти COVID-19

для людей віком від 50
років та віком від 16 до 49
років, які мають проблеми
зі здоров'ям або слабку
імунну систему

Опубліковано HSE
19 грудня 2022 року
Версія 3



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Цю інформацію призначено для таких осіб:

- віком 50 років і більше
- віком від 16 до 49 років та станом здоров'я, що наражає їх на високий ризик важкого перебігу захворювання, якщо вони заразяться COVID-19 (зокрема люди зі слабкою імунною системою) або проживають у закладі тривалого догляду

Навіщо робити ще одне щеплення від COVID-19?

Важливо своєчасно поновлювати щеплення від COVID-19, **навіть якщо ви вже щеплені або перехворіли на COVID-19. Це пов'язано з тим, що:**

- захист, який ви отримали після попередніх щеплень вакцинами, або захист після перенесеної інфекції COVID-19 може із часом слабшати
- у вас може бути підвищений ризик розвитку ускладнень у разі захворювання на COVID-19

Бустери підвищують рівень захисту від COVID-19. Без щеплення ви наражаєтеся на більший ризик серйозного перебігу хвороби, якщо ви все-таки заразитесь COVID-19.

Скільки доз вакцини проти COVID-19 я мав(ла) отримати?

За рекомендацією Національного консультативного комітету з імунізації (NIAC):

- ви мали отримати першу серію щеплень проти COVID-19 (зазвичай двома дозами, за винятком людей, які отримали одну дозу вакцини проти COVID-19 компанії Janssen). Якщо у вас ослаблений імунітет (слабка імунна система), вам слід було отримати додаткову дозу в межах основного курсу
- після цього ви маєте отримати першу бустерну дозу
- після цього має бути введено другу бустерну дозу
- якщо вам уже виповнилося 65 років або у вас ослаблений імунітет (слабка імунна система), тепер ви можете отримати третю бустерну дозу
- якщо вам від 16 до 64 років, ви маєте хронічне захворювання і не отримували щеплення адаптованою вакциною проти COVID-19, ви можете отримати третю бустерну дозу адаптованою версією вакцини. Інформацію про адаптовані вакцини представлено на наступній сторінці.

Коли я маю отримати бустер?

Ви маєте отримати бустерну дозу щонайменше через 4 місяці після останнього щеплення від COVID-19.

Якщо ви перехворіли на COVID-19, вам слід почекати не менш ніж 4 місяці після появи симптомів або після отримання позитивного результату аналізу, перш ніж отримувати бустерну дозу.

Яку вакцину мені запропонують для бустерного щеплення?

Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) в Ірландії рекомендував три адаптовані мРНК вакцини проти COVID-19 як бустерні дози після схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Це такі вакцини:

- Comirnaty® BA.1 (Вакцина Pfizer)
- Comirnaty® BA.4-5 (Вакцина Pfizer)
- Spikevax® BA.1. (Вакцина Moderna)

Хоча всі попередні вакцини забезпечують захист від COVID-19, очікується, що адаптовані вакцини забезпечать ширший захист від варіантів COVID-19.

Що відомо про безпеку бустерів?

У нас є менше інформації про безпеку другого та наступних бустерів проти COVID-19. Однак багато країн ввели своєму населенню кілька доз вакцини проти COVID-19. Дослідження показують, що досі не було жодних непередбачених проблем із безпекою в людей, які отримали кілька бустерів.

Очікується, що безпека адаптованих вакцин буде подібною до попередніх вакцин. EMA продовжить контролювати безпеку вакцин.

Усі адаптовані вакцини містять триметамол, тому ви не можете зробити щеплення ними, якщо у вас була анафілаксія (важка алергічна реакція) на триметамол.

Чи ліцензовані бустерні вакцини Європейським агентством з лікарських засобів (EMA)?

Другий або наступні бустери мРНК-вакцин не були схвалені EMA. Однак EMA та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) випустили рекомендації про те, що другу бустерну дозу мРНК-вакцини проти COVID-19 можна вводити особам віком 60 років і більше, а також людям із захворюванням, які підвищують ризик ускладнень, оскільки друга бустерна доза забезпечить кращий захист.

Рекомендації NIAC можуть відрізнятися від рекомендацій EMA через місцеві особливості та показники. В Ірландії ми дотримуємося рекомендацій NIAC.

Чи можна отримати вакцину проти COVID-19 одночасно з вакциною проти грипу?

Так. Якщо ви збираєтеся зробити щеплення від грипу, можна одночасно зробити щеплення будь-якою вакциною проти COVID-19.

Додаткова інформація

Ви можете ознайомитися з докладнішою інформацією на сайті **[hse.ie/covid19vaccine](https://www.hse.ie/covid19vaccine)** або зателефонувати нашим фахівцям у **HSELive за телефоном 1800 700 700**. Вони працюють з 8:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю та з 9:00 до 17:00 у суботу та неділю.

Ви також можете звернутися до свого терапевта, медсестри, фармацевта або вакцилятора.

Опубліковано HSE
19 грудня 2022 року
Версія 3



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland