



COVID-19
VACCINE

د COVID-19 واکسینونه

ستاسو د **Novavax** یا **Pfizer**
واکسین په اړه معلومات

نسخه 2
اگست 2024



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

ددې معلوماتې کتابچې په اړه

دا معلوماتي کتابچه ستاسو د COVID-19 واکسينونو په اړه عمومي معلومات وړاندې کوي.

مخکې له دې چې تاسو واکسين ترلاسه کړئ، دا معلوماتي کتابچه ستاسو د لوستلو لپاره آنلاین شتون لري او د واکسين ترلاسه کولو پرمهال به دا تاسو ته درکړل شي.

- واکسينونه، پياوړي کوونکي (بوستر) او اضافي دوزونه
- مناسب ګرځول شوي واکسينونه
- اميندواري او شديدې (تی) ورکول
- COVID-19 او ماشومان
- د عمر له مخې وړاندیز شوي واکسينونه
- د COVID-19 واکسين له ترلاسه کولو څخه وروسته د څه شي تمه کولی شئ
- له دې دوو واکسينونو څخه هر يو يې - اړخيزې اغېزې (جانبې عوارض) او کله بايد يو ځانګړی واکسين ترسره نشي

د COVID-19 Pfizer واکسين چې د Comirnaty په نوم هم يادېږي

« د Pfizer واکسين احتمالي اړخيزې اغېزې (جانبې عوارض)

« کله بايد تاسو د Pfizer واکسين ترسره نکړئ

د COVID-19 Novavax واکسين چې د Nuvaxovid په نوم هم يادېږي

« د Novavax واکسين احتمالي اړخيزې اغېزې (جانبې عوارض)

« کله بايد تاسو د Novavax واکسين ترسره نکړئ

- د واکسين د اغېزې کولو لپاره اړين وخت
- د اړخيزو اغېزو په اړه راپور ورکول
- ستاسو شخصي معلومات
- چيرته نور معلومات ترلاسه کولی شئ

ددې معلوماتي کتابچې له لوستلو څخه وروسته، ستاسو واکسينوونکی کولی شي چې ستاسو هرې پوښتنې ته ځواب ووايي.

د مهربانۍ له مخې دا معلوماتي کتابچه وساتئ، ځکه چې ښايي اړتيا ولرئ چې بيرته دې ته مراجعه وکړئ

که چېرې تاسو ددې معلوماتي کتابچې ژباړل شوې بڼه غواړئ، له www.hse.ie/covid19vaccinematerials څخه ليدنه وکړئ

ستاسو د COVID-19 واکسین په اړه

د COVID-19 څخه د ځان ساتلو ترټولو غوره لاره د COVID-19 واکسینونه دي. له هغه وخته چې دا واکسینونه وړاندې شوي دي، مونږ په آیرلینډ کې ددې ویروس له امله نسبتاً لږ شمېر جدي ناروغان او مړینې لیدلي دي.

د COVID-19 واکسین ترسره کول ستاسو لپاره د COVID-19 له امله د جدي عوارضو د رامنځته کېدو خطر راټیټوي. د خلکو د خوندي ساتلو او د جدي ناروغانو شمېر او د مړینو شمېر راټیټولولو ته د دوام ورکولو لپاره، HSE په آیرلینډ کې خلک واکسینوي.

دا کتابچه د آیرلینډ د COVID-19 په وړاندې د واکسینولو پروګرام کې د اوسنیو واکسینونو په اړه معلومات لري: **Pfizer** او **Novavax**.

واکسینونه، پیاوړي کوونکي (بوسټر) او اضافي دوزونه

کله چې مونږ په دې معلوماتي کتابچه کې د واکسین یا واکسینونو کلمه په کار وړو، نو له دې څخه زموږ موخه لاندې ټکي وي:

- یو لومړنی دوره - لومړنی دوز. ځینې ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې وي، ښايي د خپلې لومړنۍ دورې لپاره دویم دوز ته اړتیا ولري. هغه خلک چې د معافیت سیستم یې کمزوری وي، د خپلې لومړنۍ دورې لپاره دویم ته او ځینې ښايي دریم دوز ته اړتیا ولري.
- د ځینو خلکو عمر یا روغتيايي مخینې ته په پام سره، ښايي د هغوی لپاره د پیاوړي کوونکي (بوسټر) دوز سپارښتنه وشي.

لومړنۍ دوره

د لاندې کسانو لپاره د COVID-19 واکسین د لومړنۍ دورې سپارښتنه کېږي:

- هغه کسان چې عمرونه یې 60 کاله یا له دې پورته وي.
- هغه کسان چې عمرونه یې د 59-18 کلونو ترمنځ وي او د لویانو پاملرنې لپاره ځانګړو شوو اوږدمهاله مرکزونو کې ژوند کوي.
- هغه کسان چې عمرونه یې له 6 میاشتو څخه تر 59 کلونو پورې وي او لاندې حالتونه ولري:
 - « واکسین کولو ته له غیر مناسب غبرګون سره تړاو لرونکې د معافیت کمزوري.
 - « د داسې طبي شرایطو (ناروغیو) لرونکي چې د COVID-19 له امله په روغتون له بستري کېدو، شدیدې ناروغۍ یا مرګ سره تړاو لري.
- د روغتیا او پاملرنې برخې کارکوونکي
- امیندواره تنکي ځوانان او لویان

د هغو سالمو (صحتمندو) کسانو لپاره چې عمرونه یې له 6 میاشتو څخه تر 59 کلونو پورې وي، په منظم ډول د COVID-19 واکسین د لومړنۍ دورې ترسره کولو سپارښتنه نه کېږي. خو له خپل روغتیاپال (د بېلګې په توګه، عمومي ډاکټر، درمل پوه یا د HSE واکسینوونکي) سره د خبرو اترو پر بنسټ، تاسو کولی شئ چې د COVID-19 واکسین لومړني دوز ته لاسرسی ومومئ.

د واکسين لومړنۍ دوره په لاندې ډول تعريفېږي:

- د هغو کسانو لپاره يو واحد دوز چې عمرونه يې 5 کاله يا له دې پورته وي.
- د هغو کسانو لپاره چې عمرونه يې له 6 مياشتو څخه تر 4 کلونو پورې وي.
- « د 4 اونيو په واټن سره لومړنی او دويم دوز، که چېرې دوی مخکې په COVID-19 ناروغۍ باندې اخته شوي نه وي.
- « يو واحد دوز، که چېرې دوی مخکې په COVID-19 ناروغۍ اخته شوي وي.
- د هغو کسانو لپاره چې عمرونه يې 6 مياشتې له دې پورته وي او د معافيت کمزوری سیستم ولري، د 4 اونيو په واټن سره لومړنی او دويم دوز.

دريم دوز

دريم دوز د اړوند متخصص ډاکټر له لارښوونې وروسته ښايي هغه کسانو ته له دويم دوز څخه 8 اونۍ وروسته ورکړل شي چې د معافيت کمزوری سیستم لري.

پياوړي کوونکي (بوستر) دوزونه

هغه خوندیتوب چې تاسو له مخکینيو واکسينونو څخه يا هغه خوندیتوب چې تاسو په COVID-19 له اخته کېدو څخه ترلاسه کړی وي، ښايي د وخت په تېرېدو سره کمزوری شي. پياوړي کوونکي (بوستر) دوزونه د COVID-19 د شديدو عوارضو په مقابل کې ستاسو خوندیتوب لوړوي. له لومړنۍ دورې څخه وروسته، د ځينو وګړو لپاره د پياوړي کوونکي (بوستر) دوزونو سپارښتنه کېږي. په دې اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره چې ستاسو د COVID-19 بل واکسين کله ترسره کېږي، له www.hse.ie څخه لیدنه وکړئ يا د **1800 700 700** شمېرې په وسیله په HSELive کې زموږ له ټیم سره اړیکه ونیسئ.

مناسب ګرځول شوي واکسينونه

تاسو ته به د Pfizer لخوا تازه جوړ شوی د Comirnaty mRNA واکسين درکړل شي يا د هغو کسانو لپاره چې نشي کولی يا نه غواړي چې د mRNA واکسين ترلاسه کړي، نو تاسو ته به د Novavax لخوا تازه جوړ شوی د COVID-19 د Nuvaxovid واکسين درکړل شي.

د COVID-19 د فشارونو د بېلابېلو ډولونو په وړاندې د خوندي کولو لپاره د Comirnaty مناسب ګرځول شوي واکسينونه mRNA لري. تمه کېږي چې دا واکسينونه د اصلي واکسين په پرتله د COVID-19 د بېلابېلو بڼو په مقابل کې د پراخه خوندیتوب لامل کېږي.

د Novavax واکسين هم د COVID-19 مناسب ګرځول شوی واکسين دی.

د مناسب ګرځول شويو واکسينونو سپارښتنه د معافيت ملي مشوري کمیټې (National Immunisation Advisory Committee) له لوري کېږي او د اروپا د درملو ادارې (European Medicines Agency) له لوري منل شوي دي.

د اروپا د درملو ادارې (EMA) او د معافیت ملي مشورتي کمیټې (NIAC) مشورې ممکن ځینې وختونه توپیر ولري. کله چې داسې څه پیښېږي، نو مونږ په آیرلینډ کې د NIAC لارښوونې تعقیبوو.

امیندواري او شیدې (تی) ورکول

که چېرې تاسو امیندواره یاست، نو باید د COVID-19 واکسین ترسره کړئ.

که چېرې شیدې (تی) ورکوئ، نو د COVID-19 واکسین ترسره کول خوندي دي (کوم خطر نلري).

که چېرې تاسو د ماشوم لرلو هڅه کوئ یا ښایي امیندواره شئ، نو اړتیا نلري چې د COVID-19 واکسین ترسره کول وځنډوئ.

ډېری امیندواره خلک چې په ویروس اخته کېږي، حتی که چېرې د COVID-19 واکسین یې هم نه وي کړي، بیا هم له کم څخه تر معتدل پورې نښې نښانې لري. دوی د پلان سره سم ماشوم زیږوي او خپل ماشوم ته د COVID-19 ناروغۍ د انتقالولو خطر یې لږ دی.

خو که چېرې تاسو د امیندواری پر مهال د COVID-19 په ناروغۍ اخته شئ، نو ډېر احتمال شته چې تاسو شدید ناروغه او د جدي پاملرنې په څانګه کې درملنې ته اړتیا پیدا کړئ. دا ویروس ښایي ستاسو په ماشوم باندې هم اغېزې ولري.

هغه ماشومان چې عمر یې له 1 کال څخه کم وي، د COVID-19 له امله په روغتون کې د بستري کېدو او شدید ناروغه کېدو له لور خطر سره مخامخ وي. هغه نوي زیږېدلي ماشومان چې میندو یې د امیندواری پرمهال واکسین ترسره کړی وي، لږ احتمال لري چې د COVID-19 له امله په روغتون کې درملنې ته اړتیا پیدا کړي.

دا خوندي (بې خطر) ده چې د امیندواری پرمهال د نورو ترسره کېدونکو واکسینونو سره په ورته مهال خپل د COVID-19 واکسین ترسره کړئ.

که چېرې تاسو امیندواره یاست، نو احتمال لري چې تاسو ته د **Pfizer** واکسین درکړل شي. دا د mRNA ډول واکسین دی - هغه واکسین چې ستاسو بدن ته د COVID-19 ویروس په مقابل کې د مقاومت لپاره د انټي باډۍ د جوړولو څرنگوالی ورښايي.

خو که چېرې تاسو ته ستاسو د ډاکټر له لوري لارښوونه شوې وي چې نشئ کولی د mRNA واکسین ترسره کړئ، نو د یو ډاکټر، قابلې یا واکسینوونکي په څېر، له یو روغتیايي متخصص سره ستاسو لپاره د واکسین د خطرونو او ګټو په اړه له خبرو اترو وروسته د **Novavax** واکسین ترسره کول په پام کې نیول کېدی شي.

مونږ په امیندواره میرمنو باندې د **Novavax** واکسین د کارولو په اړه لږ معلومات لرو. تاسو کولی شئ چې په www.hse.ie کې نور معلومات ترلاسه کړئ.

که چېرې تاسو خپله د واکسین لومړنۍ دوره نه وي ترسره کړي، نو دا د امیندواری په هره مرحله کې ترسره کېدی شي.

که چېرې تاسو امیندواره یاست، نو د COVID-19 واکسین یا په وېروس له اخته کېدو څخه له 6 میاشتو ډېر وخت تېرېدو وروسته د امیندواری پرمهال د COVID-19 پیاوړي کوونکي (بوسټر) واکسین ترسره کولو سپارښتنه کېږي. دا پیاوړي کوونکي (بوسټر) دوز د امیندواری په هره مرحله کې ترسره کېدی شي خو د امیندواری په 20-34 اونيو کې یې د ترسره کولو سپارښتنه کېږي. که چېرې ستاسو د COVID-19 مخکیني واکسین یا مرض څخه له 12 میاشتو څخه ډېر وخت تېر شوی وي، نو تاسو کولی شئ چې دا ژر ترسره کړئ.

که چېرې تاسو کومه پوښتنه لرئ، نو کولی شئ چې له یو باوري روغتیايي متخصص سره خبرې وکړئ.

د امیندواری پرمهال تاسو د COVID-19 یوازې یو دوز واکسین ته اړتیا لرئ. خو که چېرې تاسو امیندواره یاست او د معافیت کمزوری سیستم لرئ، نو کولی شئ چې د COVID-19 له خپل مخکیني واکسین ترسره کولو یا مرض څخه لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته دویم دوز ترسره کړئ.

COVID-19 او ماشومان

د هغو ماشومانو اکثریت چې په COVID-19 باندې اخته کېږي، ډېرې کمې نښې نښانې یا هیڅ نښې نښانې نلري.

COVID-19 د جدي ناروغۍ، روغتون کې د بستر کېدا یا آن چې د مرګ لامل ګرځېدلی شي، خوا داسې ډېر لږ کیږي. سره له دې چې په ماشومانو کې بستري کېدو او شدیدې ناروغۍ خطر ډېر کم دی، دا خطر په کوچنیو ماشومانو کې نسبتاً لوړ دی.

ځینې وخت د COVID-19 سره تړاو لرونکې نښې د څو اونيو یا میاشتو پورې دوام لري. دې ته 'اوږد کووید' ویل کیږي. د دې ناروغۍ خطر د لویانو په پرتله په ماشومانو کې کم وي.

د ماشوم له پاره د COVID-19 له امله په روغتون کې د بستري کېدو خطر ډېر کم دی، او د هر ماشوم له پاره د سختې ناروغۍ او درملنې خطر هم لا ډېر کم دی.

ماشومان چې ځینې روغتیايي وضعیتونه لري په جدي ډول د ناروغه کېدو یا بستري کېدو زیات خطر لري که په COVID-19 اخته شي.

په ډېرو نادرو موقعو کې، COVID-19 په ماشومانو کې د ګڼو سستمونو کې د سوځېدا سندروم (MIS-C) په نوم د یو وضعیت لامل ګرځېدلی شي.

نوموړی وضعیت د سینه بغل، د زړه د التهاب او په تنفس کې د ستونزو لامل کیږي. د MIS-C لرونکي ماشومان په روغتون یا جدي پاملرنې څانګه کې له څه وخت تېرولو وروسته بیرته جوړېږي او ډېر لږ شمېر یې مړه کېږي.

د ستاسې د ماشوم د واکسين کېدا لپاره د ستاسې رضایت

د هر ماشوم د واکسين کولو لپاره به د والدينو يا قانوني سرپرست څخه د واکسين د ورکولو اجازه اخستل کېږي.

د واکسين ترسره کولو لپاره ستاسو د رضایت ورکړې يا نه ورکړې ته درناوی کېږي.

ستاسو د غوراويو په اړه د باخبره اوسېدلو په موخه ښايي لاندې جدول ګټور وي.

د خپل ماشوم د واکسين د نه ترلاسه کولو فکر وکړئ، يا د نورو معلوماتو ترلاسي پورې انتظار کوئ، که:	د خپل ماشوم د واکسين د ترلاسه کولو په اړه فکر وکړئ که:
- تاسې د واکسيناسيون له امله نه غواړئ چې د مايوکارډايټس او د پيري کارډايټس د ډېرو نادرو وضعيتونو خطر په غاړه واخلي. - تاسو غواړئ په تمه واوسئ تر څو په ماشومانو کې د COVID-19 د التهابي سندروم د څو ګوني سيستم (Multisystem Inflammatory Syndrome) د را منځته کېدو د خطر په اړه نور معلومات د لاسرسي وړ وګرځي. - تاسو غواړئ په تمه شئ تر څو پر ماشومانو د واکسين د اوږد مهاله اغېزو په اړه نور معلومات د لاسرسي وړ وګرځي.	- ستاسې ماشوم داسې اساسي روغتيايي وضعيتونه لري چې که COVID-19 ورته ولګي نو زيات جدي ناروغيه کېدو خطر لري. - ستاسې ماشوم يو داسې ماشوم يا بالغ سره اوسېږي چې د COVID-19 لوړ خطر لري. - تاسو غواړئ چې خپل ماشوم د COVID-19 د خورا کمياب امکان شديد احتمالي التهابي سندروم د څو ګوني سيستم (Multisystem Inflammatory Syndrome) يا "اوږد کوويډ" پر وړاندې خوندي کړئ.

د واکسين گټې:

- له COVID-19 څخه خوندیتوب.
- د هغو ماشومانو لپاره خوندیتوب چې داسې روغتیايي ستونزې (ناروغۍ) لري چې د COVID-19 له امله له جدي ناروغه کېدو له خطر سره یې مخامخ کوي.
- د جدي COVID-19 ناروغۍ څخه د سالمو (صحتمندو) ماشومانو خوندیتوب - سره له دې چې داپېښې په دې عمر خلکو کې ډېر نادرې دي. د ماشوم له پاره د COVID-19 له امله په روغتون کې د بستري کېدو خطر ډېر کم دی، او د هر ماشوم له پاره د سختې ناروغۍ او درملنې خطر هم لا ډېر کم دی.
- له COVID-19 څخه خوندیتوب، او د COVID-19 پېچلتیاوي لکه 'اوږده کووید' او د گڼو سیستونو التهابی سینډروم (Multisystem Inflammatory Syndrome) په ماشومانو کې.
- ښايي مرسته وکړي چې نورو ته د COVID-19 د خپرېدا څخه مخنیوی وشي. دا په ځانگړې ډول په هغه وخت کې مهمه ده کله چې ماشومان او ځوانان له خپلې داسې خور/ورور یا یو لوی کس سره ژوند کوي چې د COVID-19 جدي ناروغۍ له خطر سره مخامخ وي.

د واکسين خطرونه:

- د لنډې مودې اړخیز اغېزونه لکه سور شوی مټ، تبه، یا ستړیا.
- ښايي په 100000 تنانو کې 1 تن جدي اړخیز اغېزونه ولري، لکه واکسين ته الرجیک عکس العمل.
- ډېر په نادره موقعو ځينې خلک د واکسين ترلاسه کولو وروسته په زړه کې د سوځېدا احساس (مایوکارډایټس) یا د زړه بهرنۍ سطحه کې د سوځېدا احساس (پېري کارډایټس) ولري. ډېری خلک د مایوکارډایټس او پېري کارډایټس څخه روغ شي خو ښايي چې روغتون کې بستر کېدا ته اړتیا ولري.
- موږ تر دې دمه پر ماشومانو کې د COVID-19 واکسين د اغېزو په اړه معلومات نلرو.

د عمر له مخې وړاندیز شوي واکسینونه

د لاندې حالتونو په لرلو سره د COVID-19 ټول واکسینونه تاسو ته د COVID-19 ناروغۍ له امله له جدي ناروغه کېدو څخه خونديتوب برابروي:

- ستاسو د واکسین لومړنۍ دوره او
- هر هغه پیاوړي کوونکي (بوسټر) دوزونه چې ستاسو لپاره یې سپارښتنه کېږي.

د معافیت ملي مشورتي کمیټه (NIAC) سپارښتنه کوي چې تاسو د لومړنۍ دورې لپاره د **Pfizer - COVID-19 mRNA** مناسب ګرځول شوی واکسین او پیاوړي کوونکي (بوسټر) دوزونه ترسره کړئ، حتی که چېرې تاسو مخکې بل ډول واکسین هم ترسره کړي وي.

د عمر له مخې مشوره:

کچیرته تاسو:

- 6 میاشتې یا له دې پورته عمر لرئ، نو تاسو ته د COVID-19 لپاره د **Pfizer** واکسین درکړل شي

که چېرې تاسو د mRNA واکسین نشئ ترسره کولی یا نه غواړئ چې د mRNA واکسین ترسره کړئ، نو ښايي چې تاسو ته د **Novavax** واکسین درکړل شي. **Novavax** په هغو خلکو باندې د استعمال لپاره منل شوی دی چې عمرونه یې 12 کاله یا له دې پورته وي.

د COVID-19 واکسین له ترلاسه کولو څخه وروسته د څه شي تمه کولی شئ

د ټولو درملو په شان واکسین هم **اړخیز اغېزې** لرلای شي. ډېری اغېزونه یې له نرم څخه تر معتدل، لنډمهاله دي، او هر چا کې نه ښکاره کېږي.

سختې اړخیزې اغېزې، لکه حساسیتي عکس العمل، په ندرت سره لیدل شوي دي. تاسو ته واکسین درکوونکی د جدي الرجیک عکس العمل د درملنې روزنه لري.

اړخیزې اغېزې ښايي د هر واکسین لپاره توپیر ولري او د هغه واکسین لپاره چې تاسو یې ترسره کوئ باید دا معلوماتي کتابچه او د تولیدوونکي له لوري د ناروغانو لپاره چمتو شوې معلوماتي پاڼه ولولئ. د تولیدوونکي معلوماتي پاڼه په **www.hse.ie** کې شتون لري یا مونږ کولی شو چې د واکسین ترسره کولو په ورځ تاسو ته یې یوه کاپي درکړو.

په بله برخه کې، مونږ تاسو ته په دې معلوماتي کتابچه کې د COVID-19 د دوو تشرېح شوو واکسینونو د اړخیزو اغېزو (جانبی) عوارضو په اړه معلومات درکوو او تاسو ته وایو چې دا اړخیزې اغېزې څومره عامې یا نادره دي. همدارنګه مونږ په دې اړه هم معلومات ورکوو چې څوک باید واکسین ترسره نکړي. تاسو کولی شئ چې په **www.hse.ie** نور معلومات ومومئ.

دا 2 واکسینونه - د دوی اړخیزې اغېزې (جانبی عوارض) او کله باید یو ځانګړی واکسین ترسره نشي

په بله پانه کېږي، مونږ تاسو ته د احتمالي اړخیزو اغېزو په اړه او داچې څه وخت باید یو ځانګړی واکسین ترسره نشي، معلومات درکړو. مونږ اړخیزې اغېزې په ډلو باندې ویشو چې له ډېرو عامو څخه بیا تر ډېرو نادرې پورې دي.

- ډېرې عامې - په 10 کسانو کې له 1 څخه ډېرې
- عامې - په 10 کسانو کې تر 1 پورې
- غیر معمولي - په 100 کسانو کې تر 1 پورې
- نادرې - په 1,000 کسانو کې تر 1 پورې
- ډېرې نادرې - په 10,000 کسانو کې تر 1 پورې
- خورا نادرې. دا لا تر اوسه معلومه نده چې ددې واکسین ترسره کوونکي څومره کسان له دې اړخیزو اغېزو سره مخ کېږي مګر خو داسې فکر کېږي چې دا خورا نادرې دي.

په داسې حال کې چې مختلف واکسینونه مشترکې اړخیزې اغېزې لري، تاسو باید د ترسره کوونکي واکسین لپاره ذکر شوو اړخیزو اغېزو ته پام وکړئ. د واکسین نوم ستاسو د واکسینوونکي له لوري تاسو ته په درکړل شوي کارت او د معلوماتي کتابچې په پاڼو باندې ذکر شوی وي. تاسو باید د واکسین له ترسره کولو څخه وروسته په ساعتونو او ورځو کې د واکسین اړخیزو اغېزو ته پام وکړئ.

د COVID-19 Pfizer واکسین چې د Comirnaty په نوم هم یادېږي

احتمالي اړخیزې اغېزې او داچې په څومره تکرار سره واقع کېږي، لاندې ذکر شوي دي، چې ورپسې هغه معلومات راوړل شوي دي چې کله باید دا واکسین ترسره نشي. که چېرې په کوم شک کې یاست، نو تل له یو باوري روغتیايي متخصص څخه پوښتنه وکړئ.

احتمالي اړخیزې اغېزې (جانبی عوارض):

ډېرې عامې

په 10 کسانو کې له 1 څخه ډېرې

- د ستړیا احساس
- له لمس کولو سره حساسیت لرل (په هغو ماشومانو کې چې عمر ونه یې له 6 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې وي) یا په هغه ځای کې درد یا پړسوب چېرې چې تاسو د واکسین پیچکاری کړي وي
- د سر درد
- عضلاتو کې درد
- د غړو درد
- دستونه
- تبه - د حرارت درجه د سانتي ګراد 38 درجې یا پورته - یا لرزه
- په واکسین شوې ځای کې سوروالی (په هغو ماشومانو کې چې عمر ونه یې له 6 میاشتو څخه تر 11 کلونو پورې وي)
- تحریکېدنه (په هغو ماشومانو کې چې عمر ونه یې له 6 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې وي)
- د اشتها کموالی (په هغو ماشومانو کې چې عمر ونه یې له 6 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې وي)
- خوږوږی (په هغو ماشومانو کې چې عمر ونه یې له 6 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې وي)

عامې

په 10 کسانو کې تر 1 پورې

- د زړه بدېدنه
- کانګې کول
- په واکسین شوې ځای کې سوروالی
- د لمفایو غدو پړسوب. دا له پیاوړي کوونکي (بوسټر) دوز څخه وروسته ډېر عام وي.
- ګرمکې (په هغو ماشومانو کې چې عمر ونه یې له 6 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې وي)

غير معمولې په 100 کسانو کې تر 1 پورې	• په واکسين شوي ځای کې خاړښت • سربدالي/سر گرځېدنه • عمومي خاړښت • حساسيتي غبرگونونه لکه په مخ باندې لړمې يا گرمکې يا پرسوب • بى خوبې • له حده ډېره خوله کول • شپنۍ خولې • د اشتها کموالی • د انرژۍ لږوالی، بى حالي يا د ناروغۍ احساس • په هغه لاس کې درد چې واکسين پکې شوی
نادرې په 1.000 کسانو کې تر 1 پورې	• د مخ په يوه پلو کې لنډمهاله ځوړندېدنه
ډېرې نادرې په 10.000 کسانو کې تر 1 پورې	• مايوکارډايټس (myocarditis) او پېري کارډايټس (pericarditis). د زړه عضلې د التهاب يا د زړه عضلې دنني پوښ په معنى دى. د نښو نښانو لپاره بله پاڼه وگورئ.
خورا نادرې تکرار يې تر اوسه معلوم ندی	• يو شديد حساسيتي غبرگون • ايرېټيما ملټيفورما (Erythema Multiforme)، د پوستکي غبرگون چې په پوستکي باندې د سور رنگ داغونو او سوروالي لامل گرځي چې د په نښه شوي ځای يا "دايروي سوري" ته ورته ښکاري چې په مينځ کې تک سور او چاپېره پيکه سرې حلقې لري • د مخ پرسوب که چېرې تاسو د مخ ډکونکي لړئ • په هغه مټ يا ورون کې خورا ډېر پرسوب چېرې چې واکسين شوی دى • د بدن په ځينو برخو کې د اغزي کېدو يا د چوڅېدلو احساس يا • د احساس له لاسه ورکول • شديد مياشتنى عادت (حيض)

مايوکارډايټس او پېري کارډايټس د په زړه کې د سوځېدا د احساس وضعيتونه دي. په ځوانو سړيو کې د دې خورا نادر وضعيت رامنځته کېدو خطر تر نورو ډېر دى.

د زړه دا وضعيتونه د دويم خوراک وروسته د رامنځته کېدو زيات امکان لري او ډېرى وخت د واکسين ترلاسه کولو وروسته په 14 ورځو کې دننه رامنځته کېږي.

دو اروپايي څېړنو د واکسين له دويم دوز څخه وروسته د مايوکارډايټيس اټکل کړی دى:

- په هر 38,000 نارينو کې يوه اضافي پېښه چې عمر يې د 12 څخه تر 29 و (په 7 ورځو کې دننه)
- په هر 17,500 نارينو کې يوه اضافي پېښه چې عمر يې د 16 څخه تر 24 و (په 28 ورځو کې دننه)

موجود معلومات ښيي چې له 5 څخه تر 11 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو کې د لومړنۍ دورې وروسته مایوکارډایټس او پیریکارډایټس خورا نادر او د 12 څخه تر 17 کلونو پورې عمر لرونکو کسانو په نسبت کم دی. د پیاوړي کوونکو (بوستر) دوزونو وروسته د مایوکارډایټس او پیریکارډایټس نرخونه په لومړني دورې کې د دوهم دوز څخه وروسته وخت په پرتله لوړ نه ښکاري.

ډېری خلک په خپله یا ملاتړي معالجې سره ښه کیږي، خو په روغتون کې پاملرنې ته به اړتیا ولري. موږ له نه یو پوهه چې آیا دغه اړخیزو اغېزونو له امله به کوم اوږد مهاله ستونزې پيدا شي یا نه.

د مایوکارډایټس او پېري کارډایټس نښې

ددې واکسين له کولو څخه وروسته، که چېرې تاسې ددې نښو نښانو څخه کومه یوه یې ولرئ، نو طبي مرسته ترلاسه کړئ:

- ساه لنډي
- د زړه چټک یا غیر معمولي ضربان - د زړه زورور ضربان چې ښايي غیر معمولي وي
- په سینه کې درد

تاسو باید د COVID-19 د Pfizer Comirnaty واکسين ونکړئ که چېرې:

- تاسو د پولی ایتلین گلايکول یا PEG په گډون د واکسين له موادو څخه کوم یوه له امله سخت حساسيتي غبرگون درلودلی وي. د اجزاو د لیست کتلو لپاره د ناروغانو لپاره د تولیدوونکي معلوماتي پاڼه وگورئ.
- تاسو د COVID-19 د Pfizer واکسين یا Moderna Spikevax واکسين د پخواني دوز وروسته سخت حساسيتي غبرگون درلود.
- تاسو له ټرومېټامول (Trometamol) څخه وروسته شدید حساسيتي غبرگون درلود چې د روښنایۍ هغه توپیر کې یو له کارېدونکو موادو څخه دی چې په MRI راډیولوژيکي څېړنو کې استعمالېږي.
- تاسو ته د ډاکټر له لوري ویل شوي وي چې د طبي لاملونو له امله باید تاسو د COVID-19 د Moderna Spikevax واکسين یا د COVID-19 د Pfizer واکسين ونکړئ.

د COVID-19 ددې واکسين له کولو څخه مخکې له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ، که چېرې تاسو:

- په تېر وخت کې د بل واکسين یا درملو په کډون شدید حساسيتي غبرگون (anaphylaxis) درلود.
- د COVID-19 واکسينونو د مخکیني دوز څخه وروسته تاسو مایوکارډایټس (myocarditis) او پېري کارډایټس (pericarditis) یعنې د زړه د عضلې التهاب یا د زړه عضلې لاندې پوښ درلود.

هغه ماشومان چې مخکې یې د التهاب ملتي سیستم سندروم (Multisystem Inflammatory Syndrome - MIS-C) درلود، کولی شي چې له روغېدو وروسته او له تشخیص لږ تر لږه 90 ورځې وروسته، هر یو له دې چې وروسته وي، د COVID-19 واکسين وکړي.

که چېرې تاسو په دې وروستیو کې د MPOX - چې مخکې د Moneyox (بیزو شري) په نوم پېژندل کېده - د Imvanex یا Jynneos واکسين ترلاسه کړي وي، نو د مایوکارډایټس د نامعلوم خطر له امله باید د COVID-19 واکسين له ترلاسه کولو څخه مخکې 4 اونۍ انتظار وکړئ.

د COVID-19 د Novavax واکسين - چې د Nuvaxovid په نوم هم پېژندل کېږي

احتمالي اړخيزې اغېزې او داچې په څومره تکرار سره واقع کېږي، لاندې ذکر شوي دي، چې ورپسې هغه معلومات راوړل شوي دي چې کله بايد دا واکسين ترسره نشي. که چېرې په کوم شک کې ياست، نو تل له يو باوري روغتيايي متخصص څخه پوښتنه وکړئ.

احتمالي اړخيزې اغېزې (جانبې عوارض):

- د ستړيا احساس - په عمومي ډول د ناروغۍ احساس - د سر درد - د زړه بدېدنه يا کانگې راتلنه - عضلاتو کې درد - د غړو درد - ستاسو په هغه مټ کې له لمس کولو سره حساسيت يا درد چېرې چې تاسو واکسين پېچکارۍ کړي وي	ډېرې عامې په 10 کسانو کې له 1 څخه ډېرې
- تبه (د تودوخې درجه 38 سانتي گراد يا پورته) - په شاوخوا کې درد - په واکسين شوې ځای کې سوروالی او پړسوب	عامې په 10 کسانو کې تر 1 پورې
- د لمفوي غدو پړسوب - د وينی لوړ فشار چې د واکسين کولو وروسته د څو ورځو لپاره دوام وکړي - له سږو رېږدېدل - يو بخار يا سرې دانې - د پوستکي سوروالی - عمومي خارش - په واکسين شوي ځای کې خارش - لړمې	غیر معمولې په 100 کسانو کې تر 1 پورې
په واکسين شوې ځای کې تودوالی	نادرې په 1000 کسانو کې تر 1 پورې
- انافيلکسس (anaphylaxis) - يو شديد حساسيتي غبرگون - د بدن په ځينو برخو کې د اغزي کېدو يا د چوڅېدلو احساس يا د احساس له لاسه ورکول - مايوکارډايټس (myocarditis) او پېري کارډايټس (pericarditis). د زړه عضلې د التهاب يا د زړه عضلې دنني پوښ په معنی دی.	خورا نادرې تکرار يې تر اوسه معلوم ندی

د مایوکارډایټس او پېري کارډایټس نښې

مایوکارډایټس (myocarditis) او پېري کارډایټس (pericarditis) د زړه التهابي ناروغیو دي. که څه هم د دغو ناروغیو د رامنځته کېدو خطر ډېر کم دی خو بیا هم تاسې یې باید نښې وپېژنئ. نښې دا نښې نښانې د واکسین له کولو څخه یو څو ورځې وروسته رامنځته شي او په اصل کې په 14 ورځو کې واقع کېږي. ددې واکسین له کولو څخه وروسته، که چېرې تاسې ددې نښو نښانو څخه کومه یوه یې ولرئ، نو طبي مرسته ترلاسه کړئ:

- ساه لنډې
- زوروره رپېدنه (د زړه زوروره رپېدنه چې ښايي بې ترتیبه وي)
- په سینه کې درد

تاسو باید د COVID-19 د Novavax (Nuvaxovid) واکسین ونکړئ که چېرې

- په تېر وخت کې تاسو د واکسین له موادو (د پولی سوربېټ 80 په ګډون) څخه سخت حساسیتي غبرګون درلودلی وي. د اجزاو د لیست کتلو لپاره د ناروغانو لپاره د تولیدوونکي معلوماتي پاڼه وګورئ. د مهربانۍ له مخې په یاد ولرئ چې د COVID-19 واکسینونه Janssen او Astrazeneca (Vaxzevria) هم پولی سوربېټ 80 لري.
- تاسو د واکسین پخواني دوز ته سخت حساسیتي غبرګون درلود.

د COVID-19 ددې واکسین له کولو څخه مخکې له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ، که چېرې تاسو:

- د COVID-19 واکسینونو د مخکیني دوز څخه وروسته تاسو مایوکارډایټس (myocarditis) او پېري کارډایټس (pericarditis) (د زړه د پوښ التهاب) درلود.
 - په تېر وخت کې سخت حساسیتي غبرګون (anaphylaxis) درلود، په شمول د کوم بل واکسین یا درمل پر وړاندې.
- که چېرې تاسو په دې وروستیو کې د MPOX (چې مخکې د Moneyox (بیزو شري)) په نوم پېژندل کېده، (د Imvanex یا Jynneos) واکسین ترلاسه کړي وي، نو د مایوکارډایټس د نامعلوم خطر له امله باید د COVID-19 واکسین له ترلاسه کولو څخه مخکې 4 اونۍ انتظار وکړئ.

په هغه وخت کې باید څه وشي کله چې تاسو تبه یا نرم درد یا سخت درد لرئ

که تاسو تبه یا نرم یا سخت دردونه لرئ، نو تاسو یې د ارامولو لپاره پاراسیټامول یا آیبوپروفن خوړلی شئ. خو که ستاسو تبه له 48 ساعتونو څخه زیاته پاتې شي یا که تاسو اوس هم اندېښمن یاست، مهرباني وکړئ روغتیايي مشوره ترلاسه کړئ.

د واکسین د اغېزې کولو لپاره اړین وخت

ستاسو د معافیتي سیستم غبرگون ښودل او له تاسو څخه د COVID-19 په مقابل کې ساتنه کول د واکسین له ترلاسه کولو څخه وروسته، تر 14 ورځو پورې، یو څه وخت نیسي.

ددې قوي او باوري شواهد شتون لري چې د COVID-19 واکسینونه د COVID-19 له امله د مړینو او سخت ناروغه کېدو په مخنیوي کې خورا اغېزناک دي.

تاسو باید د خپل ځان او نورو خلکو د خوندي ساتلو په اړه په www.hse.ie کې موجودې د عامې روغتیا مشورې تعقیب کړئ

څنگه د اړخیزو اغېزو په اړه راپور ورکولی شئ

مونږ د COVID-19 واکسینونو په اړه پوهه ترلاسه کوو. که چېرې تاسو د COVID-19 واکسین کولو څخه وروسته له اړخیزې اغېزې سره مخ کېږئ، نو مونږ له تاسو غوښتنه کوو چې په اړه یې د روغتیايي محصولاتو تنظیموونکې ادارې (HPRA) ته خبر ورکړئ.

HPRA په ایرلینډ کې د درملو، طبي آلاتو او نورو روغتیايي محصولاتو تنظیموونکې اداره ده. د COVID-19 واکسین د یوې اړخیزې اغېزې په اړه د راپور ورکولو لپاره، د مهرباني له مخې له www.hpra.ie/report څخه لیدنه وکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې له خپل ډاکټر یا د کورنۍ له یو غړي څخه وغواړئ چې ستاسو لپاره د یوې اړخیزې اغېزې په اړه خبر ورکړي.

ستاسو شخصي معلومات

په خوندي توگه د واکسين د ورکړې او د واکسين د څارنې او تنظيمونې لپاره د ټولو اړين معلومات ثبت کولو په موخه، HSE به ستاسو شخصي معلومات کاروي. د HSE لخوا پروسس/کارول شوي ټول معلومات به د عمومي قوانينو او په ځانگړي توگه د عمومي معلوماتو د ساتنې د مقرراتو GDPR سره سم وي چې په 2018 کې نافذ شوي.

ستاسو د معلوماتو پروسس کول به قانوني او عادلانه وي. دا به د واکسين د ورکولو چارې اداره کولو د ځانگړي هدف لپاره پروسس شي. د معلوماتو د لږ تر لږ استعمال اصل پلي شوی دی.

دا په دې معنا ده چې يواځې هغه معلومات چې د ستاسو د پېژندنې، د ستاسو د ویکسين د ترلاسه کولو وخت ټاکلو، د ویکسين ترلاسه کېدو او د هغه د تاثيراتو د ثبت کولو لپاره اړين وي ساتل کېږي.

تاسو د معلوماتو د موضوع په توگه خپل هغه شخصي معلوماتو په اړه چې پروسس شوي وي د GDPR دا لاندې حقوق لرئ.

- خپلو شخصي معلوماتو په اړه د معلوماتو او د لاسرسي غوښتنه وکړئ چې دې ته په عمومي توگه د 'معلوماتو د موضوع لخوا لاسرسي' ويل کېږي. دې له مخې تاسو وړ ياست چې موږ له خوا د ستاسو په اړه ساتل شويو معلوماتو نقل ترلاسه کړئ او معاینه کړئ چې آیا دا په قانوني توگه پراسس کېږي يا نه.
- موږ سره موجودو د ستاسو په اړه معلوماتو کې د اصلاح خواست وکړئ. د دې په برکت تاسو کولای شئ چې موږ سره د ستاسو په اړه معلوماتو کې د کوم غلطيانو اصلاح وکړئ.
- خواست کولای شئ چې د ستاسو معلومات بايد له منځه يووړل شي. دا تاسو ته وړتيا ورکوي چې په داسې حال کې چې موږ د ستاسو د معلوماتو د ساتلو لپاره هېڅ کوم معقول دليل نه لرو تاسو کولای شئ چې دا معلومات ډيليټ شي يا ترې شخصي ډاټا لرې کړای شي. که تاسو د خپلو معلوماتو د پراسس کېدا په ضد اعتراض کړی دی نو کولای شئ چې د خپل حق تر مخې د دغه معلوماتو د ډيليټ کېدا يا ترې د شخصي معلوماتو د لرې کېدا غوښتنه وکړئ.
- د خپلو شخصي معلوماتو د پراسس کېدا په ضد اعتراض وکړئ.

نور معلومات په www.hse.ie/eng/gdpr کې شتون لري

چیرته نور معلومات پیدا کولی شی

www.hse.ie د لاندې موضوعاتو په اړه زموږ د متخصصینو له لوري ورکړل شوي د COVID-19 تفصیلي معلومات لري:

- موجود واکسینونه او داچې څوک یې ترلاسه کولی شي
- د واکسین ترسره کولو څرنگوالی
- د ناروغۍ له لرلو وروسته د واکسین کول
- د واکسین د دوزونو هغه شمېر چې ستاسو لپاره یې سپارښتنه کېږي
- د ماشومانو د واکسینولو په اړه پرېکړه کول
- نښې نښانې او ازموینه کول
- د خپل ځان او نورو خلکو د خوندي ساتلو په اړه مشوره

تاسو ته د درکړل شوي واکسین په اړه د نورو معلوماتو لپاره، تاسو کولو شی چې د ناروغانو لپاره د تولیدوونکي معلوماتي پاڼه ولولئ. دا به ستاسو د واکسین کولو په ورځ ستاسو لپاره شتون ولري یا تاسو کولی شی چې په **www.hse.ie/covid19vaccinePIL** کې یې ومومئ

که چېرې تاسو د واکسین په اړه کومې پوښتنې لرئ، نو کولی شی چې د خپل واکسینوونکي، ډاکټر، درمل پوه یا روغتیاپالنې ټیم په څېر د روغتیا برخې له یو مسلکي کس سره خبرې وکړئ.

همدارنگه تاسو کولی شی چې له HSELive سره په وړیا ټلیفون (Freephone)

1800 700 700 اړیکه ونیسئ. زموږ ټیم له دوشنبې څخه تر جمعې ورځې د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو یا د شنبې په ورځو د سهار له 9 بجو څخه د ماښام تر 5 بجو پورې ستاسو د مرستې لپاره شتون لري.



COVID-19
VACCINE

د HSE له لوري په اگست 2024 کې چاپ شوی
د تر ټولو تازه معلوماتو لپاره له
www.hse.ie څخه لیدنه وکړئ

دوک شې امر ف د HNI01602



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland