

Vacinas de reforço contra COVID-19

na gravidez



**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice

Publicado pelo HSE em 16
de setembro de 2022

Versão 2



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Por que devo tomar a minha próxima vacina contra COVID-19?

É importante manter-se em dia com as suas vacinas COVID-19, mesmo que você já esteja vacinado ou tenha tido COVID-19. Isto é porque:

- a proteção que você obteve das suas vacinas anteriores ou a proteção que você obteve de uma infecção por COVID-19 pode enfraquecer com o tempo
- você pode estar em maior risco de doença grave se pegar COVID-19

A COVID-19 é um risco para a sua saúde e para a saúde do seu bebê. A maioria das pessoas que contraem COVID-19 durante a gravidez apresenta sintomas leves a moderados. No entanto, é mais provável que você fique muito mal e precise de tratamento em terapia intensiva do que aquelas que não estão grávidas. O vírus também pode causar complicações para o bebê, incluindo parto prematuro ou natimorto.

Crianças menores de 1 ano correm maior risco de hospitalização e doenças graves por COVID-19. Bebês novos cujas mães foram vacinadas na gravidez tiveram menos probabilidade de precisar de cuidados hospitalares por COVID-19.

Tomar uma vacina contra COVID-19 durante a gravidez oferece a você e ao seu bebê a melhor proteção possível contra a COVID-19.

De quantas doses de vacina COVID-19 eu preciso?

Se você já tomou uma primeira rodada (geralmente 2 doses) e uma dose de reforço única antes de engravidar, você pode receber o seu segundo reforço em ou após 16 semanas de gravidez (pelo menos 4 meses após o primeiro reforço).

Se você recebeu o seu primeiro reforço na gravidez atual, não é necessária uma segunda dose de reforço.

Se você ainda não tomou essas vacinas, pode receber a sua primeira rodada de vacinas COVID-19 ou o primeiro reforço em qualquer estágio da gravidez.

Quando devo receber uma dose de reforço?

Você deve receber a dose de reforço 4 meses após a sua última vacina contra COVID-19. Se você teve COVID-19, espere pelo menos 4 meses antes de receber o seu reforço.

Qual vacina será oferecida para o reforço?

Três vacinas adaptadas mRNA COVID-19 foram recomendadas como doses de reforço pelo Comitê Consultivo Nacional de Imunização (NIAC) da Irlanda, após aprovação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Essas vacinas são:

- Comirnaty® BA.1 (vacina Pfizer)
- Comirnaty® BA.4-5 (vacina Pfizer)
- Spikevax® BA.1. (vacina Moderna)

Essas vacinas adaptadas podem ser administradas durante a gravidez. Enquanto todas as vacinas anteriores oferecem proteção contra COVID-19, as vacinas adaptadas podem oferecer uma proteção mais ampla contra as variantes da COVID-19.

O que sabemos sobre a segurança das doses de reforço?

Temos menos informações sobre a segurança da segunda dose e subsequentes reforços contra COVID-19. No entanto, diversos países ofereceram múltiplas doses de vacinas contra COVID-19 às suas populações. Estudos mostram que até agora não houve preocupações inesperadas sobre a segurança de pessoas que receberam múltiplas doses de reforço.

É esperado que a segurança das vacinas adaptadas seja similar às versões anteriores. A segurança das vacinas continuará sendo monitorada pela EMA.

Todas as versões adaptadas da vacina contém Trometamol. Se você possuir anafilaxia (reação alérgica severa) a Trometamol, você não poderá receber a vacina.

As vacinas de reforço são licenciadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA)?

O segundo reforço ou as subsequentes vacinas de mRNA não foram aprovados pela EMA.

As recomendações do NIAC podem variar das recomendações da EMA devido a dados e considerações locais. Na Irlanda, seguimos os conselhos do NIAC.

Posso receber a minha vacina COVID-19 ao mesmo tempo que a minha vacina contra a gripe?

Sim. Se você deve tomar uma vacina contra a gripe ou a coqueluche, pode tomar uma vacina COVID-19 ao mesmo tempo.

A vacina contra coqueluche é recomendada entre 16 e 36 semanas de gravidez e está disponível durante todo o ano, geralmente no seu médico de família.

Outras Informações

Você pode ler mais em hse.ie/covid19vaccine ou ligar para nossa equipe no HSELive em 1800 700 700. Eles estão abertos das 8h às 20h de segunda a sexta e das 9h às 17h aos sábados e domingos.

Você também pode falar com o seu médico, enfermeiro, farmacêutico ou vacinador de família.

Publicado pelo HSE em 16
de setembro de 2022

Versão 2



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland