COVID-19 VACCINE
Public Health Advice

Ваши бустеры от COVID-19

во время беременности

Опубликовано HSE
16 сентября 2022 г.

Версия 2

Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Почему мне следует сделать еще одну прививку от COVID-19?

Важно своевременно обновлять прививки от COVID-19, даже если вы уже вакцинированы или переболели COVID-19. Это потому что:

- ваша защита, полученная от предыдущих прививок или от перенесенной вами инфекции COVID-19, может со временем ослабнуть
- у вас может быть более высокий риск развития тяжелого заболевания, если вы заразитесь COVID-19

COVID-19 представляет опасность для вашего здоровья и здоровья вашего ребенка. У большинства людей, переболевших COVID-19 во время беременности, были симптомы легкой или средней степени тяжести. Тем не менее, вероятность сильно заболеть и оказаться на лечении в реанимации выше у беременных. Вирус также может вызвать осложнения у ребенка, включая преждевременные роды или мертворождение.

Дети в возрасте до 1 года подвержены более высокому риску госпитализации и тяжелого заболевания COVID-19. Маленькие дети, чьи матери были привиты во время беременности, реже нуждались в стационарной помощи при COVID-19.

Прививка от COVID-19 во время беременности дает вам и вашему ребенку наилучшую защиту от COVID-19.

Сколько прививок от COVID-19 мне нужно сделать?

Если вы уже получили первую серию прививок (обычно 2 дозы) и одну бустерную прививку до беременности, вы можете сделать вторую бустерную прививку на 16 неделе беременности или позже (по крайней мере, через 4 месяца после первой бустерной прививки).

Если вы получили первую бустерную прививку во время беременности, то вторая бустерная прививка не требуется.

Если вы еще не вакцинированы или не делали бустерную прививку, вы можете сделать первую серию прививок от COVID-19 или первую бустерную прививку на любом сроке беременности.

Когда мне следует сделать бустерную прививку?

Вам следует сделать бустерную прививку по крайней мере через 4 месяца после последней прививки от COVID-19. Если у вас был COVID-19, вам следует подождать не менее 4 месяцев, прежде чем делать бустерную прививку.

Какую бустерную прививку мне сделают?

Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) в Ирландии, с одобрением Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), рекомендует три адаптированные мРНК вакцины от COVID-19 в качестве бустера. Этими вакцинами являются:

- Comirnaty® BA.1 (вакцина Pfizer)
- Comirnaty® BA.4-5 (вакцина Pfizer)
- Spikevax® BA.1. (вакцина Moderna)

Адаптированные вакцины можно делать при беременности. Хотя все предыдущие вакцины обеспечивают защиту от COVID-19, ожидается, что адаптированные вакцины обеспечат более широкую защиту от разных вариаций COVID-19.

Что мы знаем о безопасности бустерных прививок?

У нас меньше информации о безопасности второй и последующих бустерных прививок от COVID-19. Тем не менее, многие страны ввели своему населению несколько прививок от COVID-19. Исследования показывают, что до сих пор не было никаких неожиданных проблем с теми, кто получил несколько бустерных прививок.

Ожидается, что безопасность адаптированных вакцин будет аналогична предыдущим вакцинам. Безопасность вакцин будет по-прежнему контролироваться EMA.

Все адаптированные вакцины содержат трометамол, поэтому их нельзя делать, если у вас была анафилаксия (тяжелая аллергическая реакция) на трометамол.

Лицензированы ли бустерные прививки Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)?

Вторая или последующие бустерные дозы мРНК-вакцины не были одобрены EMA.

Рекомендации NIAC могут отличаться от рекомендаций EMA из-за местных данных и соображений. В Ирландии мы следуем рекомендациям NIAC.

Могу ли я сделать прививку от COVID-19 вместе с другими прививками?

Да. Если вам нужно сделать прививку от гриппа или коклюша, вы можете сделать их вместе с любой прививкой от COVID-19.

Прививка от коклюша рекомендуется в период между 16 и 36 неделями беременности. Ее можно сделать в любое время года у вашего врача.

Дополнительная информация

Вы можете прочитать больше на **hse.ie/covid19vaccine или связаться с нашей командой HSELive по телефону 1800 700 700.** Они открыты с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 17:00 в субботу и воскресенье.

Вы также можете поговорить со своим врачом, медсестрой, фармацевтом или специалистом по вакцинации.

Опубликовано HSE
16 сентября 2022 г.

Версия 2

Rialtas na hÉireann
Government of Ireland