



**COVID-19  
VACCINE**  
Public Health  
Advice

# Бустери проти COVID-19

Для людей віком від 18  
до 49 років без супутніх  
захворювань

Опубліковано HSE  
23 грудня 2022 року  
Версія 1



Rialtas na hÉireann  
Government of Ireland

## Ці рекомендації для вас, якщо ваш вік від 18 до 49 років і ви:

- ✔ не маєте супутніх захворювань
- ✔ не маєте порушень імунної реакції
- ✔ не є працівником сфери охорони здоров'я
- ✔ не вагітні

### Навіщо робити ще одне щеплення?

Захист, який ви отримали після попередніх щеплень вакцинами, або захист після перенесеної інфекції COVID-19 може із часом слабшати.

Бустери підвищують рівень захисту від COVID-19.

Можливо, ви розглянете бустер також і як засіб для захисту інших.

Наприклад, якщо ви опікун або живете з кимось, хто має високий ризик зараження COVID-19, наприклад, з людиною зі слабкою імунною системою).

### Скільки доз вакцини проти COVID-19 я мав(ла) отримати?

За рекомендацією Національного консультативного комітету з імунізації (NIAC):

- ви мали отримати першу серію щеплень проти COVID-19 (зазвичай двома дозами, за винятком людей, які отримали одну дозу вакцини проти COVID-19 компанії Janssen);
- після цього ви маєте отримати першу бустерну дозу;
- тепер ви можете отримати другу бустерну дозу.

### Коли я маю отримати бустер?

Ви маєте отримати другу бустерну дозу щонайменше через 6 місяців після останнього щеплення від COVID-19.

Якщо ви перехворіли на COVID-19, вам слід зачекати не менш ніж 6 місяців після появи симптомів або після отримання позитивного результату аналізу, перш ніж отримувати бустерну дозу

### Яку вакцину мені запропонують для бустеру?

Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) в Ірландії рекомендував три адаптовані мРНК вакцини проти COVID-19 як бустерні дози після схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Це такі вакцини:

- Comirnaty® BA.1 (Вакцина Pfizer)
- Comirnaty® BA.4-5 (Вакцина Pfizer)
- Spikevax® BA.1. (Вакцина Moderna)

Хоча всі попередні вакцини забезпечують захист від COVID-19, очікується, що адаптовані вакцини забезпечать ширший захист від варіантів COVID-19.

## Що відомо про безпеку бустерів?

У нас є менше інформації про безпеку другого та наступних бустерів проти COVID-19. Однак багато країн ввели своєму населенню кілька доз вакцини проти COVID-19. Дослідження показують, що досі не було жодних непередбачених проблем із безпекою в людей, які отримали кілька бустерів. Очікується, що безпека адаптованих вакцин буде подібною до попередніх вакцин. ЕМА продовжить контролювати безпеку вакцин. Усі адаптовані вакцини містять трометамол, тому ви не можете зробити щеплення ними, якщо у вас була анафілаксія (важка алергічна реакція) на трометамол.

## Чи ліцензовані бустерні вакцини Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА)?

Другий або наступні бустери мРНК-вакцин не були схвалені ЕМА. Однак ЕМА та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) випустили рекомендації про те, що другу бустерну дозу мРНК-вакцини проти COVID-19 можна вводити особам віком від 18 років та особам віком від 16 років із захворюваннями, які підвищують ризик ускладнень, оскільки друга бустерна доза забезпечить кращий захист. Рекомендації NIAC можуть відрізнитися від рекомендацій ЕМА через місцеві особливості та показники. В Ірландії ми дотримуємося рекомендацій NIAC.

## Чи можна отримати вакцину проти COVID-19 одночасно з вакциною проти грипу?

Так. Якщо ви збираєтеся зробити щеплення від грипу, можна одночасно зробити щеплення будь-якою вакциною проти COVID-19.

## Додаткова інформація

Ви можете ознайомитися з докладнішою інформацією на сайті [hse.ie/covid19vaccine](https://www.hse.ie/covid19vaccine) або зателефонувати нашим фахівцям у HSELive за телефоном **1800 700 700**. Вони працюють з 8:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю та з 9:00 до 17:00 у суботу та неділю.

Ви також можете звернутися до свого терапевта, медсестри, фармацевта або вакцилятора.

Опубліковано HSE  
23 грудня 2022 року  
Версія 1



Rialtas na hÉireann  
Government of Ireland