



**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice

Вашите бустерни ваксини срещу COVID-19

Здравни работници

Публикувано от HSE на
16 септември 2022 г.

Версия 2



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Защо трябва да получа още една ваксина срещу COVID-19?

Ако работите в здравеопазването, вие сте изложени на висок риск от заразяване с COVID-19.

Важно е да сте актуални с вашите ваксини срещу COVID-19, дори ако вече сте ваксинирани или сте имали COVID-19. Това е така, защото защитата, която сте получили от предишните си ваксини или от инфекция с COVID-19, може да отслабне с времето.

Бустерните дози повишават защитата ви от COVID-19 и също така защитават хората, за които се грижите всеки ден.

Колко дози ваксина срещу COVID-19 би трябвало да съм получил/а?

Националният консултативен комитет по имунизация (NIAC) препоръчва следното:

- Би трябвало да сте получили първите си ваксини срещу COVID-19 (обикновено 2 дози, с изключение на хората, които са получили единична доза ваксина Janssen срещу COVID-19)
- след това би трябвало да сте получили първата си бустерна доза
- това би трябвало да бъде последвано от втора бустерна доза

Кога следва да получа бустерна доза?

Трябва да получите вашата бустерна доза поне 4 месеца след последната си ваксина срещу COVID-19.

Ако сте имали COVID-19, трябва да изчакате поне 4 месеца след появата на симптомите или след положителен тест, преди да получите бустерна доза.

Коя ваксина ще ми бъде предложена за моя бустерна ваксина?

Три адаптирани mRNA ваксини срещу COVID-19 бяха препоръчани като бустерни дози от Националния консултативен комитет по имунизация (NIAC) в Ирландия, след одобрение от Европейската агенция по лекарствата (EMA). Тези ваксини са:

- Comirnaty® BA.1 (ваксина на Pfizer)
- Comirnaty® BA.4-5 (ваксина на Pfizer)
- Spikevax® BA.1. (ваксина на Moderna)

Докато всички предишни ваксини предлагат защита срещу COVID-19, се очаква адаптираните ваксини да осигурят по-широка защита срещу вариантите на COVID-19.

Какво знаем за безопасността на бустерните дози?

Разполагаме с по-малко информация относно безопасността при втората и последващите бустерни дози срещу COVID-19. Въпреки това много държави са дали на населението си многократни дози ваксини срещу COVID-19.

Проучванията показват, че досега не е имало неочаквани опасения за безопасността на хората, които са получили повече от една бустерна доза.

Очаква се безопасността на адаптираните ваксини да бъде подобна на предишните ваксини. Безопасността на ваксините ще продължи да се наблюдава от ЕМА. Всички адаптирани ваксини съдържат трометамол и затова няма да може да ги получите, ако сте имали анафилаксия (тежка алергична реакция) към трометамол.

Бустерните ваксини лицензирани ли са от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)?

Втората или последващите бустерни дози на РНК ваксините не са одобрени от ЕМА.

Препоръките на NIAC могат да варират спрямо препоръките на ЕМА поради местните данни и съображения. В Ирландия следваме съветите на NIAC .

Мога ли да получа ваксината си срещу COVID-19 едновременно с противогрипна ваксина?

Да. Ако трябва да получите противогрипна ваксина, можете да получите, която и да е ваксина срещу COVID-19 по същото време. Не е нужно да чакате, за да получите вашата ваксина срещу COVID-19 с вашата ваксина срещу грип – можете да получите своята ваксина срещу COVID-19 сега.

Допълнителна информация

Можете да получите достъп до важна информация за ваксините срещу COVID-19 на [hse.ie/covid19vaccine](https://www.hse.ie/covid19vaccine) или да се обадите на нашия екип в HSE Live на **1800 700 700**. Те работят от 8 до 20 часа от понеделник до петък и от 9 до 17 часа в събота и неделя.

Можете също да говорите с вашия личен лекар, медицинска сестра, фармацевт или лице, предоставящо ваксини.

Публикувано от HSE на
16 септември 2022 г.

Версия 2



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland