



COVID-19
VACCINE
Public Health
Advice

ستاسو د دوهم بوستر په اړه معلومات

څوک باید دوهم ډوز واکسین ترلاسه کړي؟

کچیرته تاسو:

- د 65 او یا پورته کلونو یاست،
 - او یا هم د 12 کلونو او خورا کمزوري دفاعي سیستم لرونکي یاست،
- نو په دې صورت کې به تاسو ته د ملي خوندیتوب مشورتي کمیټې لخوا د کرونا ۱۹ د دوهم ډوز واکسینو وړاندیز وشي.

ولې باید دوهم ډوز واکسین ترلاسه کړم؟

تاسو ممکن بغیر د کرونا ۱۹، له نورو سختو ناروغيو څخه هم په خطر کې یاسته اگر که تاسو مخکې هم واکسین ترلاسه کړي وي، ځکه:

- د هغو واکسینو دفاعي ظرفیت د وخت په تیریدو سره له کمېږي او یا هم له منځه ځي
 - تاسو ممکن د شدیدې ناروغۍ له وجهې په لوړه درجه خطر کې اوسئ
 - ځکه ستاسو د بدن محافظوي سیستم د واکسینو په مقابل کې پیاوړی نه دی
- د یادونې وړ ده چې، هغه معلومات او څیړنې چې له نورو هیوادونو ترلاسه شوې دي ددې ښودنه کوي، چې دوهم ځل واکسینو په ترلاسه کولو سره به ستاسو وجود د هر ډول جدي ناروغيو پر وړاندې خورا پیاوړی شي.

کوم واکسین د دوهم ډوز په ډول کارولی شم؟

کچیرته ستاسو عمر د 30 کلونو په شاوخوا او یا هم پورته وي، نو موږ ستاسو لپاره د مودیرنا او پیزر یو ډوز واکسینو وړاندیز کوو. کچیرته تاسو د 29 کلونو او یا هم ځوان یاست، نو موږ ستاسو لپاره د پیزر یو ډوز واکسینو وړاندیز کوو. دلته د ام آر ان اې واکسین هم شتون لري. تاسو کولای شئ له دې ډول واکسینو استفاده وکړئ، که څه هم تاسو مخکې مختلف واکسین کارولي وي.

کچیرته ستاسو لپاره د ام آر ان اې واکسین ګټور ثابت نه شول، نو تاسو کولای شئ د غیر ام آر ان اې واکسینونو یو بل ډول (نوواواکس) استفاده وکړئ. موږ به تاسو ته د هغو واکسینو په اړه بشپړ معلومات درکړو کوم چې تاسو یې ترلاسه کوئ. همدارنګه تاسو کولای شئ دا په hse.ie/covid19vaccine کې ترلاسه کړئ.

خه مهال کولای شم دوهم دوز واکسین ترلاسه کړم؟

تاسو کولای شئ په لاندې حالاتو کې دوهم دوز واکسین ترلاسه کړئ:

- کله چې تاسو د کرونا ضد لمړی ځل واکسین ترلاسه کړي وي (عموما دوه دوزه)
- ستاسو د کوزوري دفاعي سیستم په صورت کې یو اضافي دوز او
- همدا شان ستاسو لمړنی بوسټر ته هم اړتیا لیدل کیږي

تاسو باید له لومړنی بوسټر له ترلاسه کولو وروسته لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته دوهم بوسټر تر لاسه کړئ. د پیری خلکو لپاره به دا د کووید ۱۹ څلورم دوز واکسین وي. که چېرې تاسو د معافیت کمزوری سیستم لرئ دا ستاسو د کووید ۱۹ پنځم دوز وي.

که چېرې تاسو د له لومړني بوسټر وروسته کووید ۱۹ درلود، د دوهم بوسټر د ترلاسه کولو لپاره لږ تر لږه څلور میاشتې انتظار وکړئ.

د دوهم ځلي بوسټر د خوندیتوب په اړه خه پوهیږو؟

د کرونا ۱۹ د دوهم بوسټر د خوندیتوب په اړه لږ معلومات لرو. په انگلستان، اسرئیل او ډنمارک کې یواری مشخصو خلکو ته د مرونه ضد دوهم دوز بوسټر واکسین ورکول کیږي. یو شمیر څیړنې دا نښې چې، هغو کسانو چې د کرونا ضد لمړی او دوهم بوسټر واکسین یې ترلاسه کړي، د خوندیتوب کوم ډول غیر توقعي پېښه نه ده ثبت شوي.

میوکارډ او پریکارډیا د زړه یو له التهابي حالاتو څخه دي، چې د ام آر ان اې واکسینونو سره ډیر کم له خطر سره مخامخ کېدای شي. چې دا ډول جاني اغیزې په هغو نارینه وو کې، چې عمر ونه یې له ۳۰ کلونو کم وي او ابتدايي دوهم دوز واکسین یې ترلاسه کړي وي، خورا زیات لیدل کیږي. نو د لمړي بوسټر واکسینو د ترلاسه کولو وروسته به دا ډول جاني عوارض کم شي.

آیا دوهم دوز بوسټر واکسین د دواگانو د اروپايي اتحاديې لخوا تایید شوي؟

د دواگانو اروپايي اتحاديې لخوا د ام آر ان اې بوسټر واکسین نه دي تایید شوي، البته د ناروېو د کابو کولو پر وړاندې د اروپايي مرکز سره په همغږۍ دا ډول واکسین هغو کسانو ته چې عمر ونه یې تر ۸۰ کلونو پورته وي ورکول کیږي، ځکه دوی په دې حالت کې د جدي ناروغيو له خطر سره مخ کېدای شي، د یادونې وړ ده چې، ددوی د خوندیتوب لپاره دوهم بوسټر واکسین لا ګټور ثابتېدای شي. د ځايي وخت او نظرياتو پر اساس د NIAC ځینې سپارښتنې ممکن د EMA سره متفاوتې وي. په آیرلینډ کې مورډ NIAC سپارښتنې تعقیبوو.

نور معلومات

تاسو کولای شئ نور معلومات په او hse.ie/covid19vaccine کې ترلاسه کړئ. همداشان تاسو کولای شئ د خپل GP، نرس، فارامیسټ او واکسیناتور سره خبرې وکړئ.

اول ورژن یې د HSE لخوا د ۲۰۲۲ کال د اپریل

پر ۷ نیټه خپور شوی



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland