



Nach Ihrem COVID-19-Impfstoff Moderna

Danke, dass Sie sich und andere durch die Impfung schützen. Jetzt, nachdem Sie die Impfung erhalten haben, bitten wir Sie, dieses Dokument sorgfältig zu lesen, damit Sie wissen, wie Sie sich in den nächsten Tagen fühlen werden und wo Sie weitere Informationen erhalten können.

Lesen Sie auch das Informationsblatt des COVID-19-Impfstoffs, das wir Ihnen mitgegeben haben. Wir geben Ihnen heute auch einen Nachweis über Ihre Impfung.

Bitte bewahren Sie den Impfpass gut auf.

Was könnte in den nächsten Tagen passieren?

Einige Personen, die den Impfstoff erhalten haben, den Sie heute bekommen haben, könnten die folgenden Nebenwirkungen bekommen:

- Empfindlichkeit, Schwellung, Rötung und/oder Juckreiz im Arm, in den Sie geimpft wurden
- Müdigkeit
- Kopfschmerzen
- geschwollene Lymphdrüsen unter dem Arm, wo Sie geimpft wurden
- Muskelschmerzen
- Gelenkschmerzen
- Übelkeit oder Erbrechen
- Fieber oder Erbrechen (Temperatur von 38 Grad Celsius oder höher).

Wie bei allen Impfstoffen können Sie vermutete Nebenwirkungen der Aufsichtsbehörde für Gesundheitsprodukte (HPRA) melden. Um Nebenwirkungen zu einem COVID-19-Impfstoff zu melden, besuchen Sie bitte www.hpra.ie/report

Was mache ich, wenn ich Fieber oder Schmerzen habe?

Wenn Sie Fieber oder Schmerzen haben, können Sie Paracetamol oder Ibuprofen nehmen. Wenn Ihr Fieber jedoch länger als 48 Stunden anhält oder wenn Sie immer noch besorgt sind, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Nehmen Sie Ibuprofen nicht ein, wenn Sie schwanger sind.

Muss ich etwas tun, bevor ich die zweite Dosis des Impfstoffs bekomme?

Wenn Sie Ihre nächste und letzte Dosis des Impfstoffs erhalten, teilen Sie dem Impfteam bitte mit, ob es Änderungen in Ihrer Krankengeschichte gegeben hat.

Bringen Sie Ihren Impfpass mit, wenn Sie sich die zweite Dosis geben lassen

Dies wird in 28 Tagen (vier Wochen) der Fall sein.

Die guten Nachrichten

Die Impfung gegen COVID-19 sollte Sie vor den schweren Komplikationen, die bei COVID-19 entstehen können, schützen.

Impfstoffe bringen Ihrem Immunsystem bei, wie es Sie vor Krankheiten schützt. Es ist viel sicherer für Ihr Immunsystem, dies durch eine Impfung zu lernen, als durch die Krankheit COVID-19 selbst.

Wir sind noch am Lernen

Es dauert 14 Tage, nachdem Sie die zweite Dosis erhalten haben, bis sie wirkt.

Es besteht ein geringes Risiko, dass Sie COVID-19 bekommen, auch wenn Sie geimpft sind. Wir wissen noch nicht, ob der Impfstoff Sie davor schützt, andere mit dem Virus zu infizieren, daher müssen Sie weiterhin die Ratschläge der öffentlichen Gesundheit befolgen:

- Befolgen Sie die Richtlinien zur sozialen Distanzierung (halten Sie nach Möglichkeit zwei Meter Abstand zu anderen Personen)
- Tragen Sie eine Gesichtsmaske
- waschen Sie sich regelmäßig die Hände.

Haben Sie Fragen?

Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zum COVID-19-Impfstoff haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Impfarzt.

Unter www.hse.ie/covid19vaccine finden Sie weitere Informationen zum COVID-19-Impfstoff.

Nebenwirkungen

Bitte melden Sie alle Nebenwirkungen an die HPRA unter www.hpra.ie/report

Veröffentlicht von HSE am 2. Februar 2021.

Version 2.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland