



## Po jūsų COVID-19 Moderna vakcinės

Dėkojame, kad apsaugojote save ir kitus vakcinuodamiesi. Dabar, kai gavote vakcinavotės, prašome atidžiai perskaityti šį dokumentą, kad žinotumėte, kaip tikėtina jausitės per artimiausias kelias dienas ir kur gauti išsamesnės informacijos.

Perskaitykite COVID-19 vakcinės informacinį lapelį, kurį jums pateikėme apie vakciną. Mes taip pat suteikiame jums įrašą apie jūsų šiandienos vakciną.

**Prašome saugoti šią įrašų kortelę.**

### **Kas gali nutikti per artimiausias kelias dienas?**

Kai kurie žmonės, kurie vakcinavosi šiandien:

- jaus jautrumą, patinimą, paraudimą ar niežėjimą toje rankoje, kurioje buvo sušvirkšta vakcina
- jaus nuovargį
- jaus galvos skausmą
- gali matyti patinusius limfmazgius po ranka, kur buvo atlikta injekcija
- jaus raumenų skausmą
- jaus sąnarių skausmą
- jaus pykinimą ar vems
- jaus karščiavimą (aukšta temperatūra - 38 laipsnių Celsijaus ar aukštesnė)

Kaip ir su visomis vakcinomis, galite pranešti apie įtariamą šalutinį poveikį sveikatos priežiūros produktų reglamentavimo institucijai (HPRA). Norėdami pranešti apie šalutinį poveikį COVID-19 vakcinai, apsilankykite

**[www.hpra.ie/report](http://www.hpra.ie/report)**

### **Ką daryti, jei turiu karščių ar jaučiu skausmą?**

Jei karščiuojate ar jaučiate skausmą, galite išgerti paracetamolį arba ibuprofeną. Tačiau, jei jūsų karščiavimas trunka ilgiau nei 48 valandas arba jei vis dar esate susirūpinęs, kreipkitės į gydytoją. Nevartokite ibuprofeno, jei esate nėščia.

**Ar man reikia ką nors padaryti prieš gaunant antrąją vakcinos dozę?** Jeigu jums buvo paskirta kita ir galutinė vakcinos dozė, pasakykite skiepijimo grupei, jei jūsų ligos istorija pasikeitė.

**Atneškite savo skiepijimo registracijos kortelę su savimi, kai ketinate gauti antrąją dozę**

Tai bus po 28 dienų (keturių savaitių).

### **Geros naujienos**

COVID-19 vakcinos gavimas turėtų apsaugoti jus nuo sunkių COVID-19 komplikacijų.

Vakcinos moko imuninę sistemą, kaip apsisaugoti nuo ligų. Jūsų imuninei sistemai yra daug saugiau išmokti, kaip apsaugoti jus per vakciną, nei susirgti COVID-19.

### **Mes vis dar mokomės**

Užtrunka 14 dienų po antrosios dozės gavimo, kad ji imtų veikti .

Yra nedidelė tikimybė, kad vis tiek galite susirgti COVID-19, net jei vakcinavotės . Mes dar nežinome, ar vakcina sustabdo viruso perdavimą kitiems, todėl jūs turite ir toliau laikytis Visuomenės sveikatos patarimų:

- vadovautis socialaus atstumo taisyklėmis (jei įmanoma, laikykitės dviejų metrų atstumo nuo kitų)
- dėvėkite veido kaukę
- nuolatos plaukite rankas

### **Turite klausimų?**

Jei dėl ko nors nesate tikri arba turite kokių nors klausimų apie COVID-19 vakciną, prašome kreiptis pas vakcinatorių .

Aplankykite [www.hse.ie/covid19vaccine](http://www.hse.ie/covid19vaccine) daugiau informacijos apie COVID-19 vakciną.

### **Šalutinis poveikis**

Prašome pranešti apie bet kokį šalutinį poveikį HPRA [www.hpra.ie/report](http://www.hpra.ie/report)

Publikuota 2021 m. vasario 2 d.

2 redakcija.



**Rialtas na hÉireann**  
Government of Ireland