



**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice

După vaccinul anti-COVID-19 de la Moderna

Vă mulțumim că vă protejați pe dvs. și pe ceilalți și că v-ați făcut vaccinul. Acum, după ce v-ați făcut vaccinul, vă rugăm să citiți cu atenție acest document, astfel încât să știți cum vă puteți aștepta să vă simțiți în următoarele zile și de unde să obțineți mai multe informații.

Citiți și prospectul pe care vi l-am oferit cu informații despre vaccinul anti-COVID-19. De asemenea, vă oferim o evidență a vaccinării dvs. de astăzi.

Vă rugăm să păstrați fișa de evidență în siguranță.

Ce s-ar putea întâmpla în următoarele zile?

- Unele persoane care și-au făcut vaccinul pe care l-ați făcut dvs. astăzi:
- vor prezenta sensibilitate, umflare, roșeață și/sau mâncărime la nivelul brațului în care le-a fost administrată injecția cu vaccinul
- se vor simți oboseite
- vor avea cefalee
- li se vor umfla ganglionii limfatici de sub brațul în care le-a fost administrată injecția
- vor avea dureri musculare
- vor avea dureri articulare
- vor prezenta stări de greață
- vor avea febră sau vărsături (temperatură ridicată de 38 de grade Celsius sau mai mare).

Ca în cazul tuturor vaccinurilor, puteți raporta reacțiile adverse suspectate Autorității de Reglementare a Produselor din Domeniul Sănătății (HPRA). Pentru a raporta reacțiile adverse la un vaccin anti-COVID-19, vă rugăm să accesați www.hpra.ie/report

Ce se întâmplă dacă am dureri sau dureri intense?

Dacă aveți febră, dureri sau dureri intense, puteți lua paracetamol sau ibuprofen pentru a vă ajuta. Cu toate acestea, dacă febra dvs. persistă mai mult de 48 de ore sau dacă sunteți îngrijorat(ă), vă rugăm să solicitați sfatul medicului. Nu luați ibuprofen dacă sunteți însărcinată.

Trebuie să fac ceva înainte de a face a doua doză de vaccin?

Când vi se administrează următoarea și ultima doză de vaccin, vă rugăm să comunicați echipei de vaccinare dacă au existat modificări în istoricul dvs. medical.

Luați cu dvs. fișa de vaccinare atunci când vi se administrează a doua doză

Acest lucru se va întâmpla peste 28 de zile (patru săptămâni).

Veștile bune

Administrarea unui vaccin anti-COVID-19 ar trebui să vă protejeze de complicațiile grave asociate cu COVID-19.

Vaccinurile învață sistemul imunitar să vă protejeze de boli. Este mult mai sigur pentru sistemul imunitar să învețe acest lucru prin vaccinare decât prin contractarea COVID-19.

Încă mai învățăm

Pentru a avea efect, vaccinul are nevoie de 14 zile după administrarea celei de-a doua doze.

Există o mică șansă să contractați în continuare COVID-19, chiar dacă vi se administrează vaccinul. Nu știm încă dacă administrarea vaccinului vă împiedică să răspândiți virusul la alte persoane, așa că trebuie să urmați în continuare recomandările de sănătate publică:

- respectați liniile directoare privind distanțarea socială (păstrați o distanță de doi metri față de ceilalți, dacă este posibil)
- acoperiți-vă fața
- spălați-vă mâinile cu regularitate.

Aveți întrebări?

Dacă nu sunteți sigur(ă) de un lucru sau aveți întrebări cu privire la vaccinul anti-COVID-19, vă rugăm să adresați întrebările astăzi persoanei care v-a vaccinat.

Accesați www.hse.ie/covid19vaccine pentru mai multe informații despre vaccinul anti-COVID-19.

Reacții adverse

Vă rugăm să raportați orice reacții adverse către HPRA la www.hpra.ie/report