



接种Comirnaty（辉瑞/拜恩泰科）2019冠状病毒病（COVID-19）疫苗后续注意事项

感谢您选择通过接种疫苗来保护自己和其他人。由于您已经接种了疫苗，我们请您仔细阅读这份文件，以帮助您了解未来几天内的身体感觉以及可获得更多信息的渠道。另外，请务必阅读我们提供的2019冠状病毒病疫苗信息宣传册。

我们还会为您提供当日接种疫苗的登记卡。请保管好登记卡。

接下来几天内可能会出现哪些情况？

对于您当日接种的疫苗，部分人群接种后可能会有以下表现：

- 手臂上注射疫苗的部位出现压痛、肿胀和/或发红；
- 感到疲倦；
- 头痛；
- 肌肉疼痛；
- 关节痛；
- 恶心；
- 发烧（体温为38摄氏度或更高）。

和接种所有疫苗后一样，您可以向爱尔兰健康产品监督管理局（HPRA）报告可疑的副作用。

如需报告2019冠状病毒病疫苗的副作用，请访问www.hpra.ie/report。

如果我出现发热或疼痛的症状该怎么办？

如果您出现了发热或疼痛的症状，则您可以服用扑热息痛或布洛芬来缓解不适。然而，如果您超过48小时后仍未退烧，或者仍有顾虑，则请及时就医。如果您是孕妇，则请勿服用布洛芬。

在接种第二剂疫苗之前，我需要做些什么？

当您接种下一剂也是最后一剂疫苗时，如果您的病史出现了任何变化，请告知疫苗接种团队。

接种第二剂疫苗时请携带接种登记卡。

请在接种第一剂疫苗的28天（四周）后再次接种第二剂疫苗。

好消息

接种2019冠状病毒病疫苗可以保护您免受2019冠状病毒病严重并发症的影响

疫苗可以引导免疫系统产生免疫反应，从而抵御疾病的侵害。对您的免疫系统来说，通过接种疫苗引发免疫反应比真正患上2019冠状病毒病后产生抗体的过程要安全得多。

我们还需要积累更多经验

接种第二剂疫苗后还需要等待7天，疫苗才能生效。

即使接种了疫苗，您依然有可能患上2019冠状病毒病，但患病的几率较低。

我们还无法确定接种疫苗是否能阻止您将病毒传播给其他人，所以您必须继续听从公共卫生建议：

- 遵循社交距离准则（尽可能与他人保持两米及以上的距离）；
- 佩戴口罩；
- 经常洗手。

是否有其他疑问？

如果您不清楚某些事项，或者对2019冠状病毒病疫苗有任何疑问，请马上咨询我们。您还可以访问 hse.ie/covid19vaccine 或致电HSELive（电话号码：**1850 24 1850**）来了解相关信息。

由HSE于2021年1月14日发布第3版。



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland