



Nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff Comirnaty (Pfizer / BioNTech)

Danke, dass Sie sich und andere durch die Impfung schützen. Nachdem Sie nun geimpft wurden, bitten wir Sie, dieses Merkblatt sorgfältig zu lesen, damit Sie wissen, wie Sie sich in den nächsten Tagen fühlen werden und wo Sie weitere Informationen erhalten können. Lesen Sie auch das Informationsblatt zur COVID-19-Impfung, die wir Ihnen ebenfalls gegeben haben.

Sie erhalten heute auch einen Nachweis über Ihre Impfung. **Bitte bewahren Sie den Impfpass sicher auf.**

Was könnte in den nächsten Tagen passieren?

Bei einigen Personen, denen der Impfstoff verabreicht wurde, mit dem Sie heute geimpft wurden, werden folgende Nebenwirkungen auftreten:

- Schmerzempfindlichkeit, Schwellung und/oder Rötung in dem Arm, in den der Impfstoff injiziert wurde
- Müdigkeitsgefühl
- Kopfschmerzen
- Muskelschmerzen
- Gelenkschmerzen
- Übelkeit
- Fieber (erhöhte Temperatur von 38 Grad Celsius oder mehr).

Wie bei allen Impfstoffen können Sie vermutete Nebenwirkungen an die Aufsichtsbehörde für Gesundheitsprodukte (HPRA) melden.

Um Nebenwirkungen zu einem COVID-19-Impfstoff zu melden, besuchen Sie bitte **www.hpra.ie/report**.

Was ist, wenn ich Fieber oder Schmerzen habe?

Wenn Sie Fieber oder Schmerzen haben, können Sie Paracetamol oder Ibuprofen einnehmen. Wenn Ihr Fieber jedoch länger als 48 Stunden anhält oder wenn Sie weiterhin besorgt sind, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Nehmen Sie Ibuprofen nicht ein, wenn Sie schwanger sind.

Muss ich etwas erledigen, bevor ich die zweite Dosis des Impfstoffs bekomme?

Bitte teilen Sie dem Impfteam bei der nächsten und letzten Dosis des Impfstoffs mit, ob es Änderungen in Ihrer Krankengeschichte gegeben hat.

Bringen Sie Ihren Impfpass mit, wenn Sie die zweite Dosis erhalten.

Dies wird nach 28 Tagen (vier Wochen) der Fall sein.

Die gute Nachricht

Eine Impfung gegen COVID-19 soll Sie vor den schweren Komplikationen von COVID-19 schützen.

Impfstoffe bringen Ihrem Immunsystem bei, Sie vor Krankheiten zu schützen. Es ist viel sicherer für Ihr Immunsystem, wenn es dies durch eine Impfung lernt, als wenn Sie COVID-19 bekommen.

Wir sind noch am Lernen

Es dauert 7 Tage, nachdem Sie die zweite Dosis erhalten haben, bis diese wirkt.

Es besteht eine geringe Chance, dass Sie COVID-19 bekommen, auch wenn Sie geimpft wurden.

Wir wissen noch nicht, ob die Impfung verhindert, dass Sie das Virus auf andere übertragen, daher müssen Sie weiterhin die Hinweise des öffentlichen Gesundheitswesens beachten:

- Befolgen Sie die Richtlinien zur sozialen Distanzierung (halten Sie nach Möglichkeit zwei Meter Abstand zu anderen Personen).
- Tragen Sie einen Gesichtsschutz.
- Waschen Sie sich regelmäßig die Hände.

Haben Sie Fragen?

Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zum COVID-19-Impfstoff haben, fragen Sie uns jetzt oder besuchen Sie [hse.ie/covid19vaccine](https://www.hse.ie/covid19vaccine) oder rufen Sie HSELive unter **1850 24 1850** an.

Veröffentlicht von HSE am 14. Januar 2021.
Version 3.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland