



# Consigli post vaccino anti COVID-19 Comirnaty (Pfizer/ BioNTech)

Grazie per aver protetto voi stessi e gli altri. Ora che avete ricevuto il vaccino, vi chiediamo di leggere questo documento con attenzione, per sapere cosa potete aspettarvi nei prossimi giorni e dove richiedere ulteriori informazioni. Vi invitiamo inoltre a leggere il foglietto informativo sul vaccino anti COVID-19 che vi abbiamo dato.

Insieme, vi consegniamo anche un tesserino con la registrazione di avvenuta vaccinazione. **Vi preghiamo di conservare questo tesserino.**

## **Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni?**

Alcune persone che hanno ricevuto questo vaccino hanno accusato sintomi quali:

- gonfiore e/o arrossamento del braccio in cui è stata fatta l'iniezione di vaccino
- stanchezza
- mal di testa
- dolori muscolari
- dolori alle articolazioni
- nausea
- febbre (pari o sopra i 38°C).

Come nel caso di tutti i vaccini, eventuali effetti collaterali sospetti vanno riferiti all'HPRA (Health Products Regulatory Authority).

Per segnalare eventuali effetti collaterali del vaccino COVID-19, vi preghiamo di visitare il sito [www.hpra.ie/report](http://www.hpra.ie/report)

## **Cosa devo fare se mi vengono febbre, malessere o dolori?**

Per alleviare eventuali sintomi di febbre, malessere o dolori, basta prendere paracetamolo o ibuprofene. Tuttavia, se i sintomi durano più di due giorni, o se siete preoccupati, potete consultare il medico. L'ibuprofene non è indicato per le donne in gravidanza.

## **Cosa devo fare prima di sottopormi alla seconda dose di vaccino?**

Quando vi presentate per la seconda e ultima dose di vaccino, informate il team di vaccinazione se avete osservato dei cambiamenti alle vostre condizioni di salute.

## **Portate con voi il tesserino della vaccinazione quando vi presentate per la seconda dose.**

La seconda dose vi sarà somministrata 28 giorni (quattro settimane) dopo la prima.

## **La buona notizia**

Farsi il vaccino anti COVID-19 dovrebbe proteggere dalle gravi complicanze che può comportare il COVID-19.

I vaccini insegnano al sistema immunitario a proteggersi dalle malattie. È molto più sicuro che il nostro sistema immunitario impari a proteggerci mediante la vaccinazione piuttosto che contraendo il COVID-19.

## **Stiamo ancora imparando**

Il vaccino inizia ad essere efficace 7 giorni dopo la somministrazione della seconda dose.

C'è una minima possibilità che si possa contrarre il COVID-19 anche dopo essersi vaccinati.

Non sappiamo ancora se il vaccino impedisce che una persona vaccinata possa trasmettere il COVID-19 a terzi, pertanto è importante continuare a seguire i consigli della sanità pubblica:

- seguire le linee guida per il distanziamento sociale (mantenere una distanza di due metri dagli altri ove possibile)
- indossare la maschera per il viso
- lavarsi le mani regolarmente.

## **Avete domande?**

Se avete ancora dubbi o domande sul vaccino anti COVID-19, potete parlarne con noi, visitare il sito [hse.ie/covid19vaccine](https://www.hse.ie/covid19vaccine) o contattare la linea HSELive al numero **1850 24 1850**.

Publicato dall'HSE il 14 gennaio 2021 -  
versione 3



Rialtas na hÉireann  
Government of Ireland