



După administrarea vaccinului Comirnaty (Pfizer/ BioNTech) împotriva COVID-19

Vă mulțumim că vă protejați pe dvs. și îi protejați și pe ceilalți vaccinându-vă. Acum, după ce ați făcut vaccinul, vă rugăm să citiți cu atenție acest document, pentru a ști cum vă puteți aștepta să vă simțiți în următoarele câteva zile și de unde puteți obține mai multe informații. Citiți inclusiv pliantul informativ referitor la vaccinul împotriva COVID-19 pe care vi l-am oferit.

De asemenea, vă vom da astăzi și un card privind vaccinarea. **Păstrați cardul în siguranță.**

Ce se poate întâmpla în următoarele câteva zile?

Unele persoane cărora li s-a administrat vaccinul pe care l-ați primit și dvs. astăzi vor manifesta următoarele simptome:

- sensibilitate, inflamarea și/sau înroșirea locului în care a fost administrat vaccinul
- oboseală
- durere de cap
- dureri musculare
- dureri articulare
- greață
- febră (temperatură de 38 de grade Celsius sau mai mare).

La fel ca în cazul tuturor vaccinurilor, puteți raporta reacțiile adverse suspectate către Autoritatea de Reglementare în Domeniul Medicamentelor (Health Products Regulatory Authority - HPRA).

Pentru a raporta reacțiile adverse cauzate de vaccinul împotriva COVID-19, vizitați **www.hpra.ie/report**

Ce fac dacă am febră sau dureri?

Dacă aveți febră sau dureri, puteți lua paracetamol sau ibuprofen pentru a vă simți mai bine. Cu toate acestea, dacă febra durează mai mult de 48 de ore sau sunteți în continuare îngrijorat(ă), solicitați sfatul medicului. Nu luați ibuprofen dacă sunteți însărcinată.

Trebuie să fac ceva anume înainte să mi se administreze a doua doză de vaccin?

Când vi se va administra următoarea și ultima doză de vaccin, vă rugăm să precizați echipei de vaccinare dacă au intervenit modificări în istoricul dvs. medical.

Când mergeți să faceți a doua doză, luați cu dvs. cardul de vaccinare.

Administrarea celei de a doua doze va avea loc la un interval de 28 de zile (patru săptămâni).

Avem vești bune

Vaccinarea împotriva COVID-19 ar trebui să vă protejeze împotriva complicațiilor grave provocate de COVID-19.

Vaccinurile învață sistemul dvs. imunitar să vă protejeze împotriva bolilor. Este mult mai sigur pentru sistemul imunitar să învețe acest lucru prin vaccinare, decât infectându-vă cu COVID-19.

Aflăm lucruri noi în continuare

Durează 7 zile după administrarea celei de a doua doze ca aceasta să își facă efectul.

Există în continuare o șansă mică să vă infectați cu COVID-19, chiar dacă ați făcut vaccinul.

Nu știm încă dacă vaccinându-vă nu mai răspândiți virusul la alte persoane, prin urmare, trebuie să respectați în continuare recomandările privind sănătatea publică:

- Respectați îndrumările privind distanțarea socială (păstrați o distanță de doi metri față de alte persoane, acolo unde este posibil)
- purtați mască sau altă formă de acoperire a feței
- spălați-vă regulat pe mâini.

Aveți întrebări?

Dacă aveți orice nelămuriri sau întrebări referitoare la vaccinul împotriva COVID-19, contactați-ne acum sau vizitați hse.ie/covid19vaccine sau sunați la Linia de asistență HSELive la nr.

1850 24 1850.

Publicat de HSE la data de 14 ianuarie 2021.

Versiunea 3.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland