



Después de recibir su vacuna de la COVID-19 Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Gracias por vacunarse. Con su gesto ha contribuido a su propia protección y a la de los demás. Ahora que se ha vacunado, le pedimos que lea atentamente este documento para saber qué esperar en los próximos días y dónde encontrar más información. Lea asimismo el folleto informativo sobre la vacuna de la COVID-19 que ya le proporcionamos.

Hoy también le entregaremos el registro de su vacuna. **Por favor, guarde la tarjeta de registro en un lugar seguro.**

¿Qué puede pasar en los próximos días?

Algunas personas que han recibido la misma vacuna que usted experimentarán:

- sensibilidad, hinchazón y/o rojez en la zona del brazo donde se inyectó la vacuna
- sensación de cansancio
- dolor de cabeza
- dolor muscular
- dolor articular
- náuseas
- fiebre (38°C o más)

Al igual que sucede con el resto de vacunas, puede notificar las sospechas de efectos secundarios a la autoridad regulatoria de productos sanitarios [HPRA- Health Products Regulatory Authority].

Para notificar efectos secundarios de la vacuna de la COVID-19, visite www.hpra.ie/report

¿Qué pasa si tengo fiebre o malestar?

Si tiene fiebre o malestar, tome paracetamol o ibuprofeno. Sin embargo, si la fiebre dura más de 48 horas o hay algo que le siga preocupando, consulte a su médico. No tome ibuprofeno si está embarazada.

¿Tengo que hacer algo antes de recibir la segunda dosis de la vacuna?

Cuando vaya a recibir la segunda y última dosis de la vacuna, informe al equipo de vacunación si se ha producido algún cambio en su historial médico.

Cuando vaya a recibir la segunda dosis, recuerde llevar su tarjeta de registro de vacunación.

La segunda dosis se administra a los 28 días (cuatro semanas) de la primera.

Las buenas noticias

Vacunarse contra la COVID-19 debería protegerle ante las complicaciones graves de la COVID-19. Las vacunas enseñan a nuestro sistema inmunológico a protegerse ante las enfermedades. Para nuestro sistema inmunológico, es mucho más seguro aprender a protegerse a través de la vacunación que contrayendo la COVID-19.

Aún estamos aprendiendo

Después de la administración de la segunda dosis, el organismo tarda 7 días en generar respuesta inmune protectora. Aún existe una pequeña posibilidad de contraer la COVID-19, incluso después de vacunarse.

Todavía no sabemos si vacunarse impide propagar el virus a otras personas, de modo que debe seguir cumpliendo las recomendaciones de salud pública:

- siga las directrices de distanciamiento social (manténgase a dos metros de distancia de los demás, si es posible)
- use un cobertor facial
- lávese las manos regularmente

¿Tiene alguna pregunta?

Si tiene alguna duda o pregunta sobre la vacuna de la COVID-19, nos la puede plantear ahora, o visitar hse.ie/covid19vaccine o llamar a HSELive al **1850 24 1850**.

Publicado por el HSE el 14 de enero de 2021. Versión 3.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland